



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

ACTES ET PRESTATIONS
AFFECTION DE LONGUE DURÉE

Néphropathie chronique grave



FÉVRIER 2012

Ce document est téléchargeable sur
www.has-Sante.fr

Haute Autorité de Santé
2 avenue du Stade de France - F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX
Tél. :+33 (0)1 55 93 70 00 - Fax :+33 (0)1 55 93 74 00

Ce document a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé en février 2012
© Haute Autorité de Santé – 2012

Sommaire

1	Avertissement.....	4
2	Critères médicaux d'admission en vigueur.....	5
3	Professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins	6
4	Biologie	8
5	Actes techniques	11
6	Traitements.....	13
6.1	<i>Traitements pharmacologiques.....</i>	<i>13</i>
6.2	<i>Autres traitements.....</i>	<i>15</i>
6.3	<i>Dispositifs médicaux, aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et appareils divers d'aide à la vie</i>	<i>16</i>

Mise à jour des actes et prestations ALD (APALD)

Les actes et prestations ALD (APALD) sont actualisés une fois par an et disponibles sur le site internet de la HAS (www.has-sante.fr).

1 Avertissement

Contexte Affection de longue durée (ALD)

Les ALD sont des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (article L.324-1).

Depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'Assurance Maladie, l'exonération du ticket modérateur pour l'assuré, est soumise à l'admission en ALD à l'aide d'un protocole de soins établi de façon conjointe entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale, signé par le patient.

Missions de la HAS en matière d'ALD

Conformément à ses missions, (article L 161-37-1 et art. R. 161-71 3), la Haute Autorité de santé formule des recommandations sur les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l'article L.324-1 pour lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application du 3° et 4° de l'article L.322-3:

Par ailleurs, elle :

- émet un avis sur les projets de décret pris en application du 3° de l'article L. 322-3 fixant la liste des affections de longue durée ;
- formule des recommandations sur les critères médicaux utilisés pour la définition de ces mêmes affections ;
- formule des recommandations sur les actes médicaux et examens biologiques que requiert le suivi des affections relevant du 10° de l'article L .322-3.

Objectif du document actes et prestations ALD

Le document actes et prestations ALD est une aide à l'élaboration du protocole de soins établi pour l'admission en ALD d'un patient, ou son renouvellement. Il est proposé comme élément de référence pour faciliter le dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil.

Ce n'est ni un outil d'aide à la décision clinique, ni un résumé du guide parcours de soins.

Contenu du document actes et prestations ALD

Ce document comporte les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, selon les règles de droit commun ou des mesures dérogatoires. Ainsi les utilisations hors AMM ou hors LPPR n'y seront inscrites qu'en cas de financement possible par un dispositif dérogatoire en vigueur.

Le document actes et prestations n'a pas de caractère limitatif. Dans le guide parcours de soins correspondant à une ALD, certaines situations particulières ou complications faisant notamment l'objet d'hospitalisation peuvent être à l'origine d'actes et de soins non précisés. De même, toutes les co-morbidités en relation avec l'affection ne peuvent être détaillées. Par ailleurs, le guide parcours de soins peut comporter des actes ou prestations recommandés mais ne bénéficiant pas d'une prise en charge financière. Aussi l'adaptation du protocole de soins à la situation de chaque patient relève du dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil de l'assurance maladie.

2 Critères médicaux d'admission en vigueur

(Décrets n°2011-74-75-77 du 19 janvier 2011 et n° 2011-716 du 24 juin 2011)

ALD 19 – « Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ou idiopathique »
(Extrait)

Relèvent de l'exonération du ticket modérateur :

Néphropathie chronique grave :

Sont concernées les atteintes glomérulaires, interstitielles, vasculaires, tubulaires ou les maladies héréditaires rénales, évoluant sur le mode chronique, en présence d'au moins un des critères de gravité suivants :

- un débit de filtration glomérulaire (estimé chez l'adulte par la formule de Cockcroft ou le MDRD et chez l'enfant par la formule de Schwartz) inférieur à 60 ml/min, à deux reprises à plus de 3 mois d'intervalle ;
- une protéinurie permanente supérieure, de façon durable à au moins deux examens, à 1 g/24 h/1,73 m² de surface corporelle et qui peut justifier un traitement continu ;
- une hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement médicamenteux au long cours (HTA > 130/80 mmHg) ;
- des troubles métaboliques phosphocalciques, acidobasiques, électrolytiques ou une anémie nécessitant un traitement et une surveillance biologique ;
- une uropathie nécessitant des soins et une surveillance continus.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable.

3 Professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins

Bilan initial	
Professionnels	Situations particulières
<ul style="list-style-type: none"> • Médecin généraliste 	<ul style="list-style-type: none"> • Adultes, enfants
<ul style="list-style-type: none"> • Pédiatre 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfants
<ul style="list-style-type: none"> • Pédiatre néphrologue 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfants
Recours selon besoin	
<ul style="list-style-type: none"> • Néphrologue 	<ul style="list-style-type: none"> • Doute diagnostique • Diagnostic étiologique • Examens spécialisés • Formes rapidement progressives
<ul style="list-style-type: none"> • Autres spécialistes 	<ul style="list-style-type: none"> • Recours aux avis spécialisés suivant l'étiologie, la pathologie associée, le type de complication ou le stade
Traitement et suivi	
Professionnels	Situations particulières
<ul style="list-style-type: none"> • Médecin généraliste 	<ul style="list-style-type: none"> • Adultes, enfants
<ul style="list-style-type: none"> • Pédiatre 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfants
<ul style="list-style-type: none"> • Pédiatre néphrologue 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfants
Recours selon besoin	
<ul style="list-style-type: none"> • Néphrologue 	<ul style="list-style-type: none"> • Traitement étiologique • Stades 1, 2, 3A : <ul style="list-style-type: none"> ○ formes évolutives rapidement progressive ○ cibles thérapeutiques non atteintes • Stades 3B, 4 ou 5 • Complications
<ul style="list-style-type: none"> • Spécialistes 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivant l'étiologie, la pathologie associée, le type de complication ou le stade de la maladie rénale chronique

Traitement et suivi	
Professionnels	Situations particulières
Recours selon besoin	
<ul style="list-style-type: none"> Chirurgien (toutes spécialités) 	<ul style="list-style-type: none"> Traitement étiologique Traitement de complications de la maladie ou de ses traitements Revascularisation chirurgicale ou par voie endovasculaire Abord vasculaire, cathéter dialyse péritonéale
<ul style="list-style-type: none"> Diététicien 	<ul style="list-style-type: none"> Education thérapeutique, Selon besoin, enquête alimentaire, conseils diététiques, suivi en lien avec le médecin généraliste, le néphrologue <i>Prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation (prise en charge possible dans le cadre de structures hospitalières ou d'un réseau)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Infirmier 	<ul style="list-style-type: none"> Selon besoin, éducation thérapeutique, soins à domicile, suivi clinique hebdomadaire Au stade de dialyse aide au traitement de suppléance à domicile
Autres intervenants potentiels	
<ul style="list-style-type: none"> Kinésithérapeute 	<ul style="list-style-type: none"> Réadaptation fonctionnelle (perte musculaire, adaptation à l'effort, endurance, etc.)
<ul style="list-style-type: none"> Psychologue 	<ul style="list-style-type: none"> Selon besoin <i>Prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation (prise en charge possible dans le cadre de structures hospitalières ou d'un réseau)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Consultation spécialisée en tabacologie ou spécialisée dans les addictions 	<ul style="list-style-type: none"> Aide au sevrage, si nécessaire
<ul style="list-style-type: none"> Centres de dialyse et unités d'hémodialyse 	<ul style="list-style-type: none"> Hémodialyse, dialyse péritonéale Formation aux techniques de traitement autonome
<ul style="list-style-type: none"> Centre de néphrologie pédiatrique 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les enfants et les adolescents de moins de 18 ans Suivi coordonné spécifique

4 Biologie

Examens	Situations particulières
Systématiques	
<ul style="list-style-type: none"> Créatininémie avec : estimation du débit de filtration glomérulaire 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients (bilan initial, suivi)
<ul style="list-style-type: none"> Créatininémie avec : estimation de la clairance de la créatinine (formule de Cockcroft et Gault) 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients (ajustement des posologies)
<ul style="list-style-type: none"> Recherche d'albuminurie ou protéinurie sur échantillon urinaire 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients (bilan initial, suivi) Albuminurie/Créatininurie (A/C) chez le diabétique Albuminurie/Créatininurie (A/C) ou Protéinurie/Créatininurie (P/C) chez le non-diabétique
<ul style="list-style-type: none"> Glycémie veineuse à jeun 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients non diabétiques : bilan initial et suivi
<ul style="list-style-type: none"> Exploration d'anomalies lipidiques (EAL) 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients : bilan initial et suivi
<ul style="list-style-type: none"> 25-OH-vitamine D 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients : bilan initial et suivi
Non Systématiques	
<ul style="list-style-type: none"> Mesure du débit de filtration glomérulaire 	<ul style="list-style-type: none"> Bilan initial et suivi selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> Cytologie urinaire quantitative (CUQ) 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients : bilan initial et suivi selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> Ionogramme plasmatique : sodium, chlore, potassium Bicarbonates 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients : bilan initial et suivi à partir du stade 3B (DFG < 45ml/min/1,73m²)
<ul style="list-style-type: none"> Hémogramme (NFS, NFP) 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients : bilan initial et suivi à partir du stade 3B (DFG < 45ml/min/1,73 m²)
<ul style="list-style-type: none"> Numération des réticulocytes 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients : bilan initial et suivi à partir du stade 3B (DFG < 45ml/min/1,73 m²)

Examens	Situations particulières
Non systématiques	
<ul style="list-style-type: none"> Ferritine sérique, fer sérique, transferrine (pour le calcul du coefficient de saturation de la transferrine) 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi à partir du stade 3B (DFG < 45 ml/min/1,73 m²)
<ul style="list-style-type: none"> Vitamine B12, folates 	<ul style="list-style-type: none"> Anémie, selon besoin
<ul style="list-style-type: none"> Protéine C-réactive (CRP) 	<ul style="list-style-type: none"> Anémie, selon besoin Dialyse
<ul style="list-style-type: none"> VGM, CCMH, TCM-Hb, pourcentage de globules rouges hypochromes ou concentration en hb des réticulocytes 	<ul style="list-style-type: none"> Anémie
<ul style="list-style-type: none"> Calcémie, phosphorémie 	<ul style="list-style-type: none"> À partir du stade 3 (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) bilan initial et suivi
<ul style="list-style-type: none"> Parathormone 	<ul style="list-style-type: none"> À partir du stade 3 (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) bilan initial et suivi
<ul style="list-style-type: none"> Phosphatases alcalines 	<ul style="list-style-type: none"> À partir du stade 4 (DFG < 30 ml/min/1,73 m²)
<ul style="list-style-type: none"> Uricémie 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients : bilan initial et suivi selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> Albuminémie 	<ul style="list-style-type: none"> À partir du stade 3B (DFG < 45ml/min/1,73 m²) : bilan initial et suivi
<ul style="list-style-type: none"> Préalbuminémie 	<ul style="list-style-type: none"> Patient dialysé, selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> Urée et sodium sur les urines de 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> À partir du stade 3B (DFG < 45ml/min/1,73 m²) : bilan initial et suivi selon contexte (<i>l'examen urée sur les urines de 24 heures n'est pas remboursé, sa prise en charge est possible dans le cadre de structures hospitalières ou de réseaux</i>)
<ul style="list-style-type: none"> Créatinine sanguine, urinaire et péritonéale 	<ul style="list-style-type: none"> Dialyse et dialyse péritonéale
<ul style="list-style-type: none"> Urémie 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi à partir du stade 5 (DFG < 15ml/min/1,73 m²)
<ul style="list-style-type: none"> Urée péritonéale 	<ul style="list-style-type: none"> Dialyse péritonéale
<ul style="list-style-type: none"> Électrophorèse des protéines sanguines et urinaires 	<ul style="list-style-type: none"> Bilan initial (diagnostic étiologique), selon contexte au cours du traitement et du suivi

Examens	Situations particulières
Non systématiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Bilan coagulation (taux de prothrombine, temps de céphaline activé) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan initial, selon contexte Bilan prébiopsie Syndrome néphrotique (complications) Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Dosage des fractions du complément C3, C4 • Dosage des autoanticorps : antinucléaires (ANA), antimembrane basale, anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan initial, selon contexte (exploration immunologique à visée étiologique)
<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium sérique 	<ul style="list-style-type: none"> • Patient dialysé, selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> • Détermination du groupe sanguin A, B, O, recherche d'anticorps irréguliers, détermination du groupe HLA, recherche d'anticorps anti-HLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Glycémie postprandiale Dosage HbA1C 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Bilan hépatique 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Sérologies VHA, VHB, VHC 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les patients dès le stade 3 (DFG < 60ml/min/1,73 m²) • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Sérologies VIH1, VIH2 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialyse • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Sérologie CMV 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Sérologie EBV 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Sérologie herpès virus 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Sérologie HTLV1, HTLV2 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Sérologie syphilis 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
<ul style="list-style-type: none"> • Sérologie toxoplasmose 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation
Surveillance biologique des traitements de la néphropathie	

5 Actes techniques

Actes	Situations particulières
<ul style="list-style-type: none"> Échographie rénale (avec ou sans recherche de résidu post-mictionnel) 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les patients, bilan initial et suivi selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> Échographie vésicale 	<ul style="list-style-type: none"> Bilan initial et suivi selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> Ponction-biopsie rénale 	<ul style="list-style-type: none"> Bilan initial (diagnostic étiologique, suivant avis du néphrologue)
<ul style="list-style-type: none"> Bilan d'extension de la maladie athéromateuse 	<ul style="list-style-type: none"> Selon contexte chez le non-dialysé Systématique en préparation à la dialyse et chez le patient dialysé
<ul style="list-style-type: none"> ECG 	<ul style="list-style-type: none"> Dialyse
<ul style="list-style-type: none"> Échographie cardiaque, épreuve d'effort, échographie cardiaque de stress, scintigraphie cardiaque 	<ul style="list-style-type: none"> Prédialyse, patient dialysé et préparation à la transplantation
<ul style="list-style-type: none"> Écho-Doppler des vaisseaux des membres inférieurs 	<ul style="list-style-type: none"> Dialyse (selon contexte)
<ul style="list-style-type: none"> Bilan diagnostique de sténose de l'artère rénale (échographie Doppler, angioscanner des artères rénales) 	<ul style="list-style-type: none"> Bilan initial et suivi (selon contexte)
<ul style="list-style-type: none"> Ostéodensitométrie osseuse Radiographies osseuses Biopsie osseuse 	<ul style="list-style-type: none"> Bilan des complications osseuses des troubles phosphocalciques
<ul style="list-style-type: none"> Doppler vasculaire des membres supérieurs 	<ul style="list-style-type: none"> Avant pose de fistule
<ul style="list-style-type: none"> Surveillance du débit de fistule par échographie Doppler, thermodilution, dilution ultrasonique (transonic) ou autre technique... 	<ul style="list-style-type: none"> Surveillance de la voie d'abord vasculaire

Actes	Situations particulières
<ul style="list-style-type: none"> • Fistulographie 	<ul style="list-style-type: none"> • Patient dialysé, selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> • Radiographie du thorax 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi de la dialyse, selon contexte
<ul style="list-style-type: none"> • Bilan morphologique prétransplantation : radio des poumons, cystographie, échographie Doppler artérielle ou artériographie des membres inférieurs, TDM des artères iliaques sans injection si calcifications vasculaires, échographie abdominale, panoramique dentaire, échographie cardiaque, scintigraphie cardiaque et/ou échographie de stress, coronarographie selon les résultats de la scintigraphie Complété par d'autres examens suivant le contexte 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan prétransplantation • Suivi du patient en attente de transplantation

6 Traitements

6.1 Traitements pharmacologiques

Traitements pharmacologiques ⁽¹⁾	Situations particulières
<ul style="list-style-type: none"> • Antihypertenseurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Hypertension artérielle et/ou albuminurie (protéinurie)
<ul style="list-style-type: none"> • Hypolipémiants 	<ul style="list-style-type: none"> • Dyslipidémie
<ul style="list-style-type: none"> • Médicaments utilisés dans la dépendance tabagique 	<ul style="list-style-type: none"> • Aide au sevrage tabagique chez les patients dépendants (Prise en charge à caractère forfaitaire selon liste de l'Assurance maladie http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/médecins/exercer-au-quotidien/prescriptions/substituts-nicotiniques.php)
<ul style="list-style-type: none"> • Agents stimulants de l'érythropoïèse 	<ul style="list-style-type: none"> • Anémie par déficit de l'érythropoïèse
<ul style="list-style-type: none"> • Fer 	<ul style="list-style-type: none"> • Carence martiale, dénutrition
<ul style="list-style-type: none"> • Vitamine B12 	<ul style="list-style-type: none"> • Anémie carencielle
<ul style="list-style-type: none"> • Folates 	<ul style="list-style-type: none"> • Anémie carencielle
<ul style="list-style-type: none"> • Acétate de calcium 	<ul style="list-style-type: none"> • Correction de l'hyperphosphorémie des patients insuffisants rénaux chroniques dialysés.
<ul style="list-style-type: none"> • Carbonate de calcium 	<ul style="list-style-type: none"> • Ostéodystrophie rénale : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hyperphosphorémie et hypocalcémie de l'insuffisance rénale chronique ○ Traitement préventif de l'ostéodystrophie rénale avant le stade d'hypocalcémie et d'hyperphosphorémie

¹ Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s'assurer que les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d'une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM). Dans le cas d'une prescription hors AMM, établie en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée, celle-ci doit faire l'objet d'une information complémentaire spécifique pour le patient.

Traitements pharmacologiques	Situations particulières
<ul style="list-style-type: none"> ● Carbonate de lanthane 	<ul style="list-style-type: none"> ● Correction de l'hyperphosphorémie du patient hémodialysé ou sous dialyse péritonéale et chez les non-dialysés avec des taux de phosphates sériques $\geq 1,78$ mmol/l²
<ul style="list-style-type: none"> ● Sevelamer 	<ul style="list-style-type: none"> ● Correction de l'hyperphosphorémie du patient hémodialysé ou en dialyse péritonéale
<ul style="list-style-type: none"> ● Carbonate de sevelamer 	<ul style="list-style-type: none"> ● Correction de l'hyperphosphorémie du patient hémodialysé ou sous dialyse péritonéale et du patient insuffisant rénal chronique non dialysé et avec des taux de phosphates sériques $\geq 1,78$ mmol/l
<ul style="list-style-type: none"> ● Vitamine D ● Cholécalférol ● Ergocalciférol ● Calcifédiol ● Alfacalcidol ● Calcitriol 	<ul style="list-style-type: none"> ● Prévention et traitement de l'ostéodystrophie rénale
<ul style="list-style-type: none"> ● Calcimimétiques 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hyperparathyroïdie, associés aux autres traitements des troubles du métabolisme phosphocalcique (patient dialysé)
<ul style="list-style-type: none"> ● Résines échangeuses d'ions 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hyperkaliémie
<ul style="list-style-type: none"> ● Hormone de croissance recombinante humaine 	<ul style="list-style-type: none"> ● Retard de croissance de l'enfant
<ul style="list-style-type: none"> ● Traitement anticoagulant 	<ul style="list-style-type: none"> ● Syndrome néphrotique secondaire ● Hypercoagulabilité
<ul style="list-style-type: none"> ● Solutions pour nutrition parentérale 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque l'alimentation orale ou entérale est impossible, insuffisante ou contre-indiquée
Vaccins	
<ul style="list-style-type: none"> ● Vaccin antigrippal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tous les patients dès le stade 3 d'insuffisance rénale chronique (DFG < 60ml/min/1,73 m²)
<ul style="list-style-type: none"> ● Vaccin contre l'hépatite B 	<ul style="list-style-type: none"> ● À partir du stade 3B selon besoin

² Cette extension d'indication est actuellement en cours d'examen par la CT, la modification devrait être publiée au JO avant la mise en ligne de la LAP.

6.2 Autres traitements

Traitements	Situations particulières
<ul style="list-style-type: none">• Transfusions	<ul style="list-style-type: none">• Anémie symptomatique chez les patients ayant un facteur de risque associé, aggravation aiguë de l'anémie par perte sanguine, hémolyse, résistance à l'érythropoïétine
<ul style="list-style-type: none">• Traitements chirurgicaux	<ul style="list-style-type: none">• Selon indications
<ul style="list-style-type: none">• Éducation thérapeutique du patient	<ul style="list-style-type: none">• Selon besoin• L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours du patient. Les professionnels de santé en évaluent la nécessité pour chaque patient. Elle n'est pas opposable au malade, et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie (art. L. 1161-1 du Code de la santé publique³).• <i>Prise en charge possible dans le cadre des programmes autorisés par les agences régionales de santé (ARS)</i>

3

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022664533&dateTexte=&categorieLien=id>

6.3 Dispositifs médicaux, aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et appareils divers d'aide à la vie

Dispositifs	Situations particulières
<ul style="list-style-type: none">• Bandes de contention des membres inférieurs	<ul style="list-style-type: none">• Œdèmes
<ul style="list-style-type: none">• Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) régis par l'arrêté du 20/09/2000 (liste actualisée chaque année), dispositifs d'administration et prestations associées.	<ul style="list-style-type: none">• Dénutrition ou risque de dénutrition (selon les critères définis à la LPPR)



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur
www.has-sante.fr