

**Vous avez une prothèse de hanche ou de genou  
depuis moins d'un mois,  
soyez vigilant et repérez rapidement les signes d'une infection**




**L'INFECTION DANS LE MOIS SUIVANT L'IMPLANTATION D'UNE PROTHÈSE EST RARE MAIS GRAVE**

**Sachez identifier les signes  
d'une infection précoce**

■ Douleur, gonflement  
et parfois rougeur

■ Cicatrice rouge, chaude,  
gonflée ou écoulement

■ Fièvre ou frissons



**C'est une URGENCE : prévenez rapidement l'équipe chirurgicale  
qui a posé la prothèse ainsi que votre médecin traitant**

➔ **Plus l'infection est diagnostiquée tôt, moins il y aura de séquelles**

Équipe médico chirurgicale :


Téléphone :

Adresse :

Médecin traitant :

# QUELLES SUITES EN CAS D'INFECTION ?

Plus l'infection est traitée tôt,  
par une intervention chirurgicale et  
par des antibiotiques, moins il y aura de séquelles



- L'intervention chirurgicale est nécessaire pour nettoyer l'os et la prothèse.
- Un changement de prothèse est parfois nécessaire.
- L'intervention permet aussi de faire un prélèvement pour adapter le traitement antibiotique. Ce traitement est long entre **3 semaines et 6 mois**.

## Pour en savoir plus

- La recommandation sur le site de la HAS :  
[www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)
- L'association le lien :  
[www.lelien-association.fr](http://www.lelien-association.fr)

N'attendez pas pour calmer  
la douleur mais

- **Suivez rigoureusement la prescription** de l'ordonnance de sortie



- **Évitez toute automédication**, en particulier les anti-inflammatoires

**HAS**

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

[www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

- Juillet 2014 -