



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

AVIS

15 octobre 2008

Examen du dossier de la spécialité inscrite pour une durée de 5 ans à compter du 3 novembre 2003 (JO du 19 novembre 2003).

SCOBUREN 20 mg/ml, solution injectable en ampoule de 1 ml **Boîte de 10 , code CIP 351 592-8**

Laboratoire RENAUDIN

Butylscopolamine
Code ATC : A03BB01

Liste I

Date de l'A.M.M. : 22 juin 1999

Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux dans l'indication « Traitement en soins palliatifs de l'occlusion intestinale ».

Indications Thérapeutiques :

- Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
- Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës en gynécologie.
- Traitement en soins palliatifs de l'occlusion intestinale **(seule indication remboursable aux assurés sociaux)**.

Posologie : cf. R.C.P.

Données de prescriptions : SCOBUREN n'est pas suffisamment prescrit en ville pour figurer dans les panels de prescription.

Réévaluation du Service Médical Rendu :

Les données acquises de la science sur la pathologie concernée et ses modalités de prise en charge ont été prises en compte (ref¹). Elles ne sont pas susceptibles de modifier l'évaluation du service médical rendu par rapport à l'avis précédent de la Commission de la Transparence.

Le service médical rendu par cette spécialité reste modéré dans l'indication « Traitement en soins palliatifs de l'occlusion intestinale ».

Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux dans l'indication « Traitement en soins palliatifs de l'occlusion intestinale »

¹ «Modalités de prise en charge de l'adulte nécessitant des soins palliatifs », recommandations ANAES, Décembre 2002.

et aux posologies de l'A.M.M.

Conditionnement : adapté aux conditions de prescription.

Taux de remboursement : 35% dans l'indication « Traitement en soins palliatifs de l'occlusion intestinale »