



Prise en charge de la douleur à domicile

Docteur Viviane Chappuis



Fiches de recueil des évaluations de la douleur

HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET SA REGION

EVALUATION VERBALE DE LA DOULEUR

JANVIER 2008 Dernière modification : JUILLET 2009

52

NOM ET PRENOM DU PATIENT		Mat.	Soir.	Nuit	Mat.	Soir.	Nuit	Mat.	Soir.	Nuit	Mat.	Soir.	Nuit	Mat.	Soir.	Nuit	Mat.	Soir.	Nuit	Mat.	Soir.	Nuit	Mat.	Soir.	Nuit	
EVALUATION	Douleur maximale imaginable	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0														
	Pas de douleur																									
	Palier I																									
	Palier II																									
	Palier III																									
	Co-antalgique																									
	Neurolept																									
	Somnolence																									
	Constipation																									
	Hallucinations																									
Autre :																										
LOCALISATION																										
FACTEURS DECLENCHANTS	Mobilisation																									
	Soins																									
	Douleur spontanée																									
	Autre :																									
QUALIFICATIFS DE LA DOULEUR	Neurogène																									
	Elémentaire, déclenché, récurrent, continu, paroxysmal, nocturne, paroxysmal, nocturne, paroxysmal, nocturne																									
	Par excès de nociception																									
	État, trouble																									
NOM DE L'INTERVENANT (en toutes lettres)		Matin	Soir	Nuit																						

HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET SA REGION

EVALUATION NON-VERBALE DE LA DOULEUR

JANVIER 2008 Dernière modification : JUILLET 2009

58


NOM ET PRENOM DU PATIENT		Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir
VIGILANCE	Conscient																								
	Inconscient																								
TRAITEMENTS	Décoloration Temp. Spéc.																								
	Palier I																								
	Palier II																								
	Palier III																								
EFFETS SECONDAIRES DU TRAITEMENT	Neurolept																								
	Somnolence																								
	Constipation																								
	Hallucinations																								
LOCALISATION																									
FACTEURS DECLENCHANTS	Mobilisation																								
	Soins																								
	Douleur spontanée																								
	Autre :																								
O = OUI / N = NON		O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N
ECHELLE D'EVALUATION	VISSAGE																								
	REGARD																								
	PLAINTES ORALES																								
	CORPS																								
TOTAL DES CROIX DE L'ALGOPLUS																									
NOM DES INTERVENANTS EN TOUTES LETTRES A LA VERTICALE																									




Étude menée sur 35 dossiers de patients nouvellement admis en HAD entre le 1^{er} septembre 2008 et le 31 décembre 2008

Profil patients


Pathologie principale



Type de soins



Répartition de l'indice de Karnofsky




Âge des patients


Moyenne	Maximum	Minimum
73 ans	95 ans	37 ans

Évaluation de la douleur à J0


Évaluation de la douleur le jour de l'admission (J0)



Échelle de douleur utilisée le jour de l'admission





Résultats de l'évaluation de la douleur à J0



DOULOUREUX : EVN > 3/10 ou Algo-plus > 2/5


Traitement en place à l'admission en HAD



Tous les patients détectés douloureux à la prise en charge ont un traitement antalgique, mais insuffisant.


Réévaluation de la douleur pendant le séjour

Réévaluation de la douleur chez l'ensemble des patients dont le dossier est complet




En moyenne, 29 réévaluations par patient pour une durée de séjour de 57 jours. Durée moyenne de séjour des patients non réévalués : 41 jours.

Nombre de réévaluations des patients détectés douloureux à l'admission




En moyenne, 38 réévaluations par patient pour une durée de séjour de 47 jours.

Nombre de réévaluations des patients détectés non douloureux à l'admission



En moyenne, 27 réévaluations par patient pour une durée de séjour de 60 jours.


Nombre de réévaluations des patients non évalués à l'admission



En moyenne, 22 réévaluations par patient pour une durée de séjour de 65 jours.


Modification du traitement de la douleur au cours du séjour

Réévaluation du traitement au cours du séjour en HAD




3 patients douloureux n'ont pas eu leur traitement réévalué

Intervention du médecin coordinateur auprès du médecin traitant lorsque le patient est douloureux




Évaluation de la douleur le jour de sortie de l'HAD

Patient douloureux à la sortie d'HAD




2 patients douloureux sous PCA de morphine


Type d'échelle utilisée pour évaluer la douleur le jour de la sortie du patient




Patient sous traitement le jour de sa sortie d'HAD




Évolution du traitement des patients entre l'entrée et la sortie d'HAD




Mode de sortie



Traitement antalgique du patient le jour de la sortie d'HAD



Traitements du patient à son admission et à sa sortie d'HAD



L'HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET REGION
5-7, avenue du Docteur Victor Robini
"Espace Nikala" • 06200 NICE
Tél. : 04 97 25 77 77
Fax : 04 97 25 77 70
had.nice.st.region@hadnics.fr
www.had-nice.fr



Prise en charge de la douleur à domicile

Docteur Viviane Chappuis

Fiches de recueil des évaluations de la douleur

HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET SA REGION
EVALUATION VERBALE DE LA DOULEUR
JANVIER 2008
Dernière modification : JUILLET 2008




NOM ET PRENOM DU PATIENT		Mat.	Soir.	Nuit.	Mat.	Soir.	Nuit.	Mat.	Soir.	Nuit.	Mat.	Soir.	Nuit.	Mat.	Soir.	Nuit.	Mat.	Soir.	Nuit.	Mat.	Soir.	Nuit.
EVALUATION	Douleur maximale imaginable	10																				
		9																				
		8																				
		7																				
		6																				
		5																				
		4																				
		3																				
		2																				
		1																				
	0																					
TRAITEMENTS	Pallier I																					
	Pallier II																					
	Pallier III																					
	Co-antalgique																					
EFFETS SECONDAIRES DU TRAITEMENT	Nausées																					
	Somnolence																					
	Constipation																					
	Hallucinations																					
LOCALISATION	Soins																					
	Douleur spontanée																					
FACTEURS DECLENCHANTS	Soins																					
	Douleur spontanée																					
QUALIFICATIFS DE LA DOULEUR	Neurologique																					
	Par excès de nociception																					
NOM DE L'INTERVENANT (en toutes lettres)	Matin																					
	Soir																					
	Nuit																					

HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET SA REGION
EVALUATION NON-VERBALE DE LA DOULEUR
JANVIER 2008
Dernière modification : JUILLET 2008

NOM ET PRENOM DU PATIENT		Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir
VIGILANCE	Conscient														
	Inconscient														
TRAITEMENTS	Observation Temp. Spec.														
	Pallier I														
	Pallier II														
	Pallier III														
EFFETS SECONDAIRES DU TRAITEMENT	Co-antalgique														
	Nausées														
	Somnolence														
	Constipation														
LOCALISATION	Hallucinations														
	Autre :														
FACTEURS DECLENCHANTS	Mobilisation														
	Soins														
	Douleur spontanée														

O = OUI	N = NON	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N
EVALUATION D'ECHELLE	ÉCHELLE														
	COMPOSANTE														
	DE LA DOULEUR														
	(ALGOPLUS)														
COMPOSANTES	PLANTES ORALES														
	CORPS														
	COMPOSANTES														
	COMPOSANTES														
TOTAL DES CROIX DE L'ALGOPLUS															
NOM DES INTERVENANTS EN TOUTES LETTRES À LA VERTICALE															

Étude menée sur 35 dossiers de patients nouvellement admis en HAD entre le 1^{er} septembre 2008 et le 31 décembre 2008



L'HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET REGION
5-7, avenue du Docteur Victor Robini
"Espace Nikala" • 06200 NICE
Tél. : 04 97 25 77 77
Fax : 04 97 25 77 70
had.nice.st.region@hadnics.fr
www.had-nice.fr

Prise en charge de la douleur à domicile

Docteur Viviane Chappuis

Fiches de recueil des évaluations de la douleur

PATIENTS COMMUNICANTS

HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET SA REGION		EVALUATION VERBALE DE LA DOULEUR		JANVIER 2008 Dernière modification : JULIET 2008		58																		
NOM ET PRENOM DU PATIENT		Mat.	Soir	Nuit	Mat.	Soir	Nuit	Mat.	Soir	Nuit	Mat.	Soir	Nuit	Mat.	Soir	Nuit	Mat.	Soir	Nuit	Mat.	Soir	Nuit		
EVALUATION	Douleur maximale imaginable	10																						
		9																						
		8																						
		7																						
		6																						
		5																						
		4																						
		3																						
		2																						
		1																						
	0																							
TRAITEMENTS	Pallier I																							
	Pallier II																							
	Pallier III																							
	Co-antalgique																							
EFFETS SECONDAIRES DU TRAITEMENT	Nausées																							
	Somnolence																							
	Constipation																							
	Hallucinations																							
	Autre :																							
LOCALISATION																								
FACTEURS DECLANCHANTS	Mobilisation																							
	Douleur spontanée																							
	Autre :																							
QUALIFICATIFS DE LA DOULEUR	Neurogène																							
	Par excès de nociception																							
NOM DE L'INTERVENANT (en toutes lettres)	Matin																							
	Nuit																							


PATIENTS NON COMMUNICANTS

HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET SA REGION		EVALUATION NON-VERBALE DE LA DOULEUR		JANVIER 2008 Dernière modification : JULIET 2008		59									
NOM ET PRENOM DU PATIENT		Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir	Matin	Soir
VIGILANCE	Conscient														
	Inconscient														
TRAITEMENTS	Décontamination Temp. Spéc.														
	Pallier I														
	Pallier II														
	Pallier III														
EFFETS SECONDAIRES DU TRAITEMENT	Co-antalgique														
	Nausées														
	Somnolence														
	Constipation														
LOCALISATION	Hallucinations														
	Autre :														
FACTEURS DECLANCHANTS	Mobilisation														
	Douleur spontanée														
O = OUI / N = NON															
ECHELLE D'EVALUATION COMPORTIMENTALE DE LA DOULEUR (ALGOPLUS)	VISAGE														
	REGARD														
TOTAL DES CROIX DE L'ALGOPLUS															
NOM DES INTERVENANTS EN TOUTES LETTRES À LA VERTICALE															


Étude menée sur 35 dossiers de patients nouvellement admis en HAD entre le 1^{er} septembre 2008 et le 31 décembre 2008

PROFILS PATIENTS


PATHOLOGIE PRINCIPALE



TYPE DE SOINS



RÉPARTITION DE L'INDICE DE KARNOFSKY




ÂGE DES PATIENTS


Moyenne	Maximum	Minimum
73 ans	95 ans	37 ans

ÉVALUATION DE LA DOULEUR À J0


ÉVALUATION DE LA DOULEUR LE JOUR DE L'ADMISSION (J0)



ÉCHELLE DE DOULEUR UTILISÉE LE JOUR DE L'ADMISSION





RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA DOULEUR À J0



DOULOUREUX : EVN > 3/5 ou Algoplus > 2/5


TRAITEMENT EN PLACE À L'ADMISSION EN HAD



Tous les patients détectés douloureux à la prise en charge ont un traitement antalgique, mais insuffisant.


RÉÉVALUATION DE LA DOULEUR PENDANT LE SÉJOUR

RÉÉVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ L'ENSEMBLE DES PATIENTS DONT LE DOSSIER EST COMPLET




En moyenne, 29 réévaluations par patient pour une durée de séjour de 57 jours. Durée moyenne de séjour des patients non réévalués : 41 jours.

NOMBRE DE RÉÉVALUATIONS DES PATIENTS DÉTECTÉS DOULOUREUX À L'ADMISSION




En moyenne, 38 réévaluations par patient pour une durée de séjour de 47 jours.

NOMBRE DE RÉÉVALUATIONS DES PATIENTS DÉTECTÉS NON DOULOUREUX À L'ADMISSION



En moyenne, 27 réévaluations par patient pour une durée de séjour de 60 jours.


NOMBRE DE RÉÉVALUATIONS DES PATIENTS NON ÉVALUÉS À L'ADMISSION



En moyenne, 22 réévaluations par patient pour une durée de séjour de 65 jours.


MODIFICATION DU TRAITEMENT DE LA DOULEUR AU COURS DU SÉJOUR

RÉÉVALUATION DU TRAITEMENT AU COURS DU SÉJOUR EN HAD




3 patients douloureux n'ont pas eu leur traitement réévalué

INTERVENTION DU MÉDECIN COORDINATEUR AUPRÈS DU MÉDECIN TRAITANT LORSQUE LE PATIENT EST DOULOUREUX




ÉVALUATION DE LA DOULEUR LE JOUR DE LA SORTIE DE L'HAD

PATIENT DOULOUREUX À LA SORTIE D'HAD




≥ patients douloureux sous PCA de morphine


TYPE D'ÉCHELLE UTILISÉE POUR ÉVALUER LA DOULEUR LE JOUR DE LA SORTIE DU PATIENT




PATIENT SOUS TRAITEMENT LE JOUR DE SA SORTIE D'HAD




ÉVOLUTION DU TRAITEMENT DES PATIENTS ENTRE L'ENTRÉE ET LA SORTIE D'HAD




MODE DE SORTIE



TRAITEMENT ANTALGIQUE DU PATIENT LE JOUR DE LA SORTIE D'HAD



TRAITEMENTS DU PATIENT À SON ADMISION ET À SA SORTIE D'HAD



L'HOSPITALISATION A DOMICILE DE NICE ET REGION

57, avenue du Docteur Victor Robini
"Espace Nikaia" - 06200 NICE

Tél. : 04 97 25 77 77
Fax : 04 97 25 77 70

had.nice.et.region@hadnice.fr • www.had-nice.fr