



COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

SYNTHÈSE D'AVIS

22 JANVIER 2020

brentuximab vedotin
ADCETRIS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Nouvelle indication

► L'essentiel

Avis défavorable au remboursement dans le traitement de 1^{ère} ligne des adultes atteints de lymphome de Hodgkin CD30+ de stade IV.

► Quelle place dans la stratégie thérapeutique ?

Le traitement de 1^{ère} ligne des adultes atteints de lymphome hodgkinien repose sur une chimiothérapie, suivie en cas de maladie persistante, d'une radiothérapie. Les protocoles de chimiothérapies utilisés sont les protocoles ABVD (doxorubicine, bléomycine, vinblastine, dacarbazine) et BEACOPP (bléomycine, étoposide, doxorubicine, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, prednisone).

Le choix du protocole dépend principalement du stade clinique de la maladie, de la présence de certains facteurs de risques et des caractéristiques du patient (âge, antécédents médicaux, état général etc.).

Place du médicament

ADCETRIS en association au protocole de chimiothérapie AVD n'a pas de place dans le traitement des patients adultes ayant un lymphome hodgkinien CD30+ de stade IV non précédemment traités.

*Ce document a été élaboré à partir de l'avis de la Commission de la transparence disponible sur
www.has-sante.fr*