

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

SYNTHÈSE D'AVIS

19 FEVRIER 2020

pomalidomide
IMNOVID 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, gélule

Nouvelle indication

► L'essentiel

Avis favorable au remboursement en association avec le bortézomib et la dexaméthasone dans le traitement du myélome multiple chez les patients adultes ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur comportant le lénalidomide.

► Quel progrès ?

Pas de progrès par rapport à l'association bortézomib / dexaméthasone.

► Quelle place dans la stratégie thérapeutique ?

Il n'existe pas de traitement standard d'une première rechute ou progression du myélome multiple. La décision thérapeutique dépend de l'âge, des traitements antérieurs, de la durée de la première rémission, des circonstances de la rechute, de l'état général du patient et de ses comorbidités.

Place du médicament

IMNOVID en association à une bithérapie par bortézomib / dexaméthasone est un traitement de deuxième ligne et plus chez des patients adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire, ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur incluant le lénalidomide.

Ce document a été élaboré à partir de l'avis de la Commission de la transparence disponible sur www.has-sante.fr