



COMMISSION DE LA TRANSPARENCE SYNTHESE D'AVIS 9 MARS 2022

riprétinib
QINLOCK 50 mg, comprimé

Première évaluation

► L'essentiel

Avis favorable au remboursement dans le traitement des patients adultes atteints d'une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) avancée, ayant reçu au préalable un traitement par au moins trois inhibiteurs de la kinase, dont l'imatinib.

► Quel progrès ?

Un progrès thérapeutique dans la prise en charge des GIST en 4^{ème} ligne de traitement chez l'adulte.

► Quelle place dans la stratégie thérapeutique ?

Selon les recommandations nationales et internationales (Thésaurus national de cancérologie digestive, ESMO et NCCN), le traitement standard des GIST non résécables ou métastatiques repose sur l'imatinib (GLIVEC), le traitement de référence de première ligne. La tolérance de l'imatinib est dose-dépendante. En cas de progression de la maladie suite à une résistance ou à une intolérance à l'imatinib, le traitement de deuxième ligne est le sunitinib (SUTENT) et en troisième ligne, le régorafénib (STIVARGA). A ce jour, aucun standard de traitement n'est recommandé en 4^{ème} ligne et plus.

Place du médicament

QINLOCK (ripréтиниб) est le seul traitement de 4^{ème} ligne et plus disposant d'une AMM et dont l'intérêt est établi chez les patients adultes atteints d'une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) avancée, ayant reçu au préalable un traitement par au moins trois inhibiteurs de la kinase, dont l'imatinib.

Il s'agit d'un nouvel inhibiteur de la tyrosine kinase des récepteurs proto-oncogènes KIT et de la kinase PDGFRA, y compris les mutations sauvages.

Ce document a été élaboré à partir de l'avis de la Commission de la transparence disponible sur www.has-sante.fr