

SYNTHÈSE

nivolumab

OPDIVO 10 mg/ml,**solution à diluer pour perfusion****Nouvelle indication****Adopté par la Commission de la transparence le 12 octobre 2022**→ **Cancer de l'œsophage**→ **Secteur : Hôpital****L'essentiel**

Avis favorable au remboursement dans le traitement, de première ligne, des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage avancé non résécable, récurrent ou métastatique dont les cellules tumorales expriment PD-L1 au seuil $\geq 1\%$, en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine.

Quel progrès ?

OPDIVO (nivolumab) apporte un progrès thérapeutique par rapport à la chimiothérapie (à base de fluoropyrimidine et de sels de platine), en première ligne de traitement des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage avancé non résécable, récurrent ou métastatique dont les cellules tumorales expriment PD-L1 au seuil $\geq 1\%$.

Quelle place dans la stratégie thérapeutique ?

Chez les patients atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage ou un adénocarcinome, localement avancé non résécable (en cas de contre-indication à la radiothérapie) ou au stade métastatique, le recours à un traitement systémique (chimiothérapie palliative) est le traitement de référence. Les principaux médicaments de chimiothérapie utilisés sont une fluoropyrimidine associée à un dérivé du platine. D'autres protocoles tel que FOLFOX associant fluorouracile-oxaliplatine-acide folinique sont parfois utilisés comme option de traitement.

Depuis 2021, KEYTRUDA (pembrolizumab) en association à une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine est un traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer de l'œsophage ou d'un adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne HER-2 négatif uniquement de type I (classification Siewert), localement avancés non résécables ou

métastatiques, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS ≥ 10 sur la base des résultats de l'étude KEYNOTE 590 (incluant environ 70% des patients avec un cancer épidermoïde).

Place d'OPDIVO (nivolumab) dans la stratégie thérapeutique :

OPDIVO (nivolumab) en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de sels de platine est une option de traitement en 1ère ligne dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage avancé non résécable, récurrent ou métastatique dont les cellules tumorales expriment PD-L1 au seuil $\geq 1\%$. Faute de données comparatives, sa place dans la stratégie thérapeutique vis-à-vis de KEYTRUDA (pembrolizumab) ne peut être déterminée.