

SYNTHÈSE

rispéridone

OKEDI 75 mg et 100 mg,

poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée

Mise à disposition d'un hybride

Adopté par la Commission de la transparence le 7 décembre 2022

- Schizophrénie
- Secteurs : Ville et Hôpital

L'essentiel

Avis favorable au remboursement dans le traitement de la schizophrénie chez les adultes pour lesquels la tolérance et l'efficacité ont été établies avec la rispéridone orale.

Quel progrès ?

Pas de progrès par rapport à la spécialité de référence RISPERDAL 4 mg (risperidone) comprimé pelliculé.

Quelle place dans la stratégie thérapeutique ?

Les antipsychotiques sont le traitement pharmacologique de référence de la schizophrénie. Ils sont utilisés dans le traitement de la phase aiguë et en traitement d'entretien dans la prévention des rechutes.

Le choix de l'antipsychotique tient compte de la réponse aux traitements reçus antérieurement, du profil de tolérance des antipsychotiques et de la susceptibilité individuelle du patient aux effets indésirables. Les antipsychotiques de seconde génération sont recommandés en première intention car ils disposent d'une meilleure tolérance que celle des antipsychotiques de première génération. La monothérapie antipsychotique doit être privilégiée.

Un abord multidimensionnel des patients souffrant de schizophrénie est nécessaire. Les traitements médicamenteux doivent être associés à des psychothérapies individuelles ou de groupe, à des prises en charge institutionnelles ou familiales et à des interventions sociales.

La prescription d'une forme injectable longue durée d'action peut être envisagée lorsque le patient exprime une préférence pour ce type de traitement et/ou lorsque des difficultés de maintien de

l'observance sont présents chez les patients suffisamment stabilisés par traitement oral lors de la phase initiale du traitement.

Place d'OKEDI (rispéridone) dans la stratégie thérapeutique :

Les spécialités OKEDI (rispéridone LP) poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée constituent une alternative thérapeutique dans le traitement de la schizophrénie chez les adultes pour lesquels la tolérance et l'efficacité ont été établies avec la rispéridone orale.