

COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ

AVIS DE LA CNEDiMTS

24 janvier 2017

Faisant suite à l'examen du 22/11/2016, la CNEDiMTS a adopté le projet d'avis le 6/12/2016.

Ce projet d'avis a fait l'objet d'une phase contradictoire examinée le 24 janvier 2017.

CONCLUSIONS

PRECISE PRO RX, endoprothèse carotidienne auto expansible

Demandeur : CARDINAL HEALTH France 506 SAS (France)

Fabricant : CORDIS Corporation (Etats-Unis)

Les modèles et références proposés par le demandeur (cf. page 3)

Indications retenues :

Indications telles que décrites sur la LPPR, à savoir :

- Le traitement des sténoses athéroscléreuses symptomatiques (> 50 %), si le chirurgien juge l'endarterectomie contre-indiquée pour des raisons techniques ou anatomiques ou si les conditions médico-chirurgicales sont jugées à risque après discussion pluridisciplinaire avec notamment avis du chirurgien vasculaire et consultation neurologique,
- Pour les sténoses athéroscléreuses asymptomatiques ($\geq$ 60 %), PRECISE PRO RX est exceptionnellement indiqué si une revascularisation est jugée nécessaire au terme d'une discussion pluridisciplinaire au cours de laquelle le chirurgien juge l'intervention contre-indiquée. Cette décision devrait prendre en compte le risque naturel d'évolution de la maladie sous traitement médical optimal,
- Le traitement des sténoses radiales et post-chirurgicales.

Service Rendu (SR) :

Suffisant, en raison de :

- l'intérêt thérapeutique dans le traitement des sténoses carotidiennes,
- l'intérêt de santé publique attendu, compte tenu du caractère de gravité des sténoses carotidiennes

Comparateur(s) retenu(s) :

Autres endoprothèses carotidiennes

Amélioration du SR :

Absence d'amélioration (ASR de niveau V)

Type d'inscription :

Inscription sous nom de marque

Durée d'inscription :

5 ans

Données analysées :	Dans cette nouvelle demande de renouvellement d'inscription, – les nouvelles données non spécifiques retenues sont : • les résultats à long terme de l'étude EVA-3S • les résultats à long terme de l'étude ICSS • les résultats à long terme de l'étude CREST • les résultats intermédiaires de l'étude ACST-2 – les nouvelles données spécifiques retenues sont: • le registre rétrospectif japonais CASCARD • le registre américain CARE • les résultats de l'étude post-inscription • les données de matérivigilance
Éléments conditionnant le SR :	
Spécifications techniques :	Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications techniques proposées par le fabricant
Modalités de prescription et d'utilisation :	La Commission souligne la difficulté opératoire de mise en place des endoprothèses qui doit être réservée : - A un opérateur ayant une expérience d'au moins 25 angioplasties avec endoprothèse de la carotide. - A des centres disposant des compétences pour pouvoir prendre en charge un accident vasculaire aigu ou disposant d'un accès à une unité spécialisée neurovasculaire. La salle interventionnelle doit disposer d'une angiographie numérisée avec capacités de soustraction, d'une table mobile et d'un arceau commandé par l'opérateur ainsi que du matériel d'anesthésie-réanimation. La présence d'un anesthésiste est recommandée. L'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée.
Conditions du renouvellement :	Actualisation des données conformément aux recommandations du guide pratique pour l'inscription au remboursement des produits et prestations.
Population cible :	Environ 1100 patients

Avis 2 définitif

ARGUMENTAIRE

01 NATURE DE LA DEMANDE

Demande de renouvellement d'inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale (LPPR dans la suite du document).

01.1. MODÈLES ET RÉFÉRENCES

Les modèles et référence proposés par le demandeur sont les suivants :

Diamètre (mm)	Longueur de l'endoprothèse (mm)		
	20	30	40
5	PC0520XCE	PC0530XCE	PC0540XCE
6	PC0620XCE	PC0630XCE	PC0640XCE
7	PC0720XCE	PC0730XCE	PC0740XCE
8	PC0820XCE	PC0830XCE	PC0840XCE
9	PC0920XCE	PC0930XCE	PC0940XCE
10	PC1020XCE	PC1030XCE	PC1040XCE

01.2. CONDITIONNEMENT

Unitaire et stérile

01.3. INDICATIONS REVENDIQUÉES

Le renouvellement de l'inscription de PRECISE PRO RX est sollicité dans les **mêmes indications et avec les mêmes modalités de prise en charge que celles actuellement définies par la HAS¹** :

- Le traitement des sténoses athéroscléreuses symptomatiques (> 50 %), si le chirurgien juge l'endartériectomie contre-indiquée pour des raisons techniques ou anatomiques ou si les conditions médico-chirurgicales sont jugées à risque après discussion pluridisciplinaire avec notamment avis du chirurgien vasculaire et consultation neurologique ;
- Pour les sténoses athéroscléreuses asymptomatiques ($\geq$ 60 %) PRECISE PRO RX est exceptionnellement indiqué si une revascularisation est jugée nécessaire au terme d'une discussion pluridisciplinaire au cours de laquelle le chirurgien juge l'intervention contre-indiquée. Cette décision devrait prendre en compte le risque naturel d'évolution de la maladie sous traitement médical optimal ;
- Le traitement des sténoses radiques et post-chirurgicales.

01.4. COMPARATEURS REVENDIQUÉS

Autres endoprothèses carotidiennes

02 HISTORIQUE DU REMBOURSEMENT

L'endoprothèse PRECISE PRO RX a été évaluée pour la première fois par la Commission en 2007. Sa prise en charge par l'Assurance Maladie, sous nom de marque, fait suite à l'arrêté² du 3/09/2009 (Journal Officiel du 10/09/2009).

¹ Haute Autorité de Santé. Stratégie de prise en charge de sténoses de la bifurcation carotidienne. Indications des techniques de revascularisation. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2007.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/rapport_stenoses_bifurcation_carotidienne.pdf

Certaines parties du document ne sont pas lisibles car le demandeur a souhaité que certaines données commerciales et industrielles demeurent confidentielles

La dernière évaluation de l'endoprothèse PRECISE PRO RX par la Commission date du 04/12/2012³. Sa prise en charge par l'Assurance Maladie, sous nom de marque, fait suite à l'arrêté^{4, 5} du 02/05/2013 (Journal Officiel du 14/05/2013) portant la fin de prise en charge au 1^{er} octobre 2016.

L'endoprothèse carotidienne PRECISE PRO RX est un dispositif d'exception et à ce titre a fait l'objet d'une fiche d'information thérapeutique.

03 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

03.1. MARQUAGE CE

Classe III, notification par British Standard Institution (organisme notifié n°0086), Royaume Uni.

03.2. DESCRIPTION

Le système PRECISE PRO RX est constitué :

- d'une endoprothèse auto-expansible PRECISE PRO RX, en nitinol, à cellule ouverte, auto-expansible. Il s'agit d'une prothèse tubulaire flexible, à mailles fines. En raison du comportement autoexpansible du nitinol, les endoprothèses sont indiquées pour être placées dans des vaisseaux dont le diamètre est 1 à 2 mm inférieur au diamètre d'implantation de l'endoprothèse. L'endoprothèse à expansion automatique PRECISE est retenue dans l'espace qui sépare la tige interne de la gaine externe distale, située entre les marqueurs distaux et proximaux sur la tige interne du système d'insertion
- du système de mise en place à gaine de 1,65 mm ou de 1,98 mm sur lequel est préchargée l'endoprothèse. Il se compose principalement d'une tige interne, d'une gaine externe avec des marqueurs radio-opaques et d'une valve de type Tuohy Borst
 - La tige interne se compose d'un membre de support et d'une lumière de guide. La partie proximale du membre de support est constituée par une embase connectée à un fil guide en acier inoxydable et à un hypotube, et sa partie distale par une bobine en acier inoxydable. La lumière du fil guide commence en position distale au niveau de l'extrémité du cathéter et se termine en position proximale au niveau de l'orifice de sortie du guide conçu pour accueillir un guide de 0,36 mm
 - La gaine externe présente une tige proximale et une gaine externe distale dont la longueur utile nominale est de 135 cm. La partie distale de la gaine externe contient l'endoprothèse sertie.

² Arrêté du 3 septembre 2009 relatif à l'inscription des endoprothèses carotidiennes autoexpansibles RX Acculink de la société Abbott France SAS, Bard Vivexx de la société Bard France SAS, Carotid Wallstent Monorail de la société Boston Scientific SA, Precise RX et Precise Pro RX de la société Cordis, et Protégé RX de la société EV3 SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République Française le 10/09/2009. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000021028428 [consulté le 31/08/2016]

³ Avis de la Commission du 04/02/2012 relatif à CORDIS PRECISE PRO RX, end prothèse carotidienne auto-expans ble. HAS ; 2012. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-01/precise_pro_rx_4273_avis.pdf

⁴ Arrêté du 02/05/2013 relatif au renouvellement d'inscription des endoprotheses carotidiennes auto-expansibles au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République Française le 14 mai 2013. <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/5/2/AFSS1311483A/jo>

⁵ Arrêté du 24/08/2015 portant modification des conditions d'inscription des endoprothèses carotidiennes auto-expansibles inscrites au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République Française le 01/09/2015. <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/24/AFSS1520315A/jo/texte>

03.3. FONCTIONS ASSURÉES

Action mécanique de prévention de la rétractation élastique de la paroi artérielle et le remodelage chronique par ses effets de tuteur.

03.4. ACTES

Dans la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM – version 43,5, 28/06/2016), les actes associés à la pose d'une endoprothèse carotidienne sont référencés sous les chapitres « dilatation intraluminale de l'artère carotide commune », « dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne » et « dilatation intraluminale de l'artère carotide extracrânienne ».

Code CCAM	Libellé de l'acte associé
EBAF001*	Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
EBAF010*	Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée
EBAF011	Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée

*l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée

04 SERVICE RENDU

04.1. INTÉRÊT DU PRODUIT

04.1.1. ANALYSE DES DONNÉES : ÉVALUATION DE L'EFFET THÉRAPEUTIQUE / EFFETS INDÉSIRABLES, RISQUES LIÉS À L'UTILISATION

04.1.1.1. RAPPEL DES AVIS PRÉCÉDEMMENT ÉMIS PAR LA COMMISSION

Dans son avis d'inscription du 12 décembre 2007⁶, la Commission s'était prononcée pour un service attendu suffisant, avec une ASA III, dans les indications retenues, chez les malades nécessitant un geste de revascularisation, et pour lesquels la chirurgie n'est pas le traitement de choix, au terme d'une discussion en concertation pluridisciplinaire, avec notamment l'avis du chirurgien vasculaire et une consultation neurologique, sur la base des éléments suivants :

1. Données non spécifiques

- Rapport d'évaluation de la Haute Autorité de Santé¹ (HAS) sur l'analyse de la littérature et prise en compte de l'avis du groupe d'experts multidisciplinaire.
- 6 études publiées (**CAVATAS**⁷, **SPACE**⁸, **EVA-3S**⁹, **SAPPHIRE**¹⁰, Naylor et al¹¹ et Brooks et al¹²) de haut niveau de preuve, prospectives, randomisées, multicentriques comparant l'angioplastie carotidienne à la chirurgie carotidienne.

⁶ Avis de la Commission du 13 juin 2007, relatif à l'endoprothèse carotidienne auto-expansible PRECISE PRO RX. <http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/cepp-1581preciseprorx.pdf>

⁷ CAVATAS Investigators. Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial. Lancet 2001;357:1729-1737.

⁸ SPACE Collaborative Group, Ringleb PA, Allenberg J, Bruckmann H, Eckstein HH, Fraedrich G, et al. 30 day results from the SPACE trial of stent-protected angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients: a randomised non-inferiority trial. Lancet 2006;368(9543):1239-47.

⁹ Mas JL, Chatellier G, Beyssens B, Branchereau A, Moulin T, Becquemin JP, et al. Endarterectomy versus stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis. N Engl J Med 2006; 355:1660-71.

¹⁰ Yadav JS, Wholey MH, Kuntz RE, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, et al. Protected carotid-artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med 2004; 351: 1493-1501.

Certaines parties du document ne sont pas lisibles car le demandeur a souhaité que certaines données commerciales et industrielles demeurent confidentielles

- Les résultats des études (**EVA-3S**, **SPACE**) n'avaient pas permis de démontrer la non-infériorité de l'angioplastie avec endoprothèse carotidienne par rapport à l'endarterectomie en terme de mortalité et d'accident vasculaire cérébral (AVC) à J30.

2. Données spécifiques à PRECISE PRO RX

- L'étude **SAPPHIRE**^{10, 13} composée :

- Des résultats à 1 an d'une étude prospective, contrôlée, randomisée, de non-infériorité comparant l'angioplastie avec pose d'une endoprothèse à l'endarterectomie, chez les patients à haut risque chirurgical ayant une sténose symptomatique > 50 % et avec une sténose asymptomatique > 80 % et incluant 334 patients,
- D'un registre incluant les patients ne pouvant pas être randomisés et incluant 406 patients.

Le renouvellement d'inscription était subordonné à la mise en place d'une étude de suivi de l'ensemble des patients traités par angioplastie avec une endoprothèse carotidienne. L'objectif principal de ce suivi était d'évaluer le taux cumulé de morbi-mortalité à J30 (taux cumulé de mortalité (toutes causes) et d'AVC (ipsi- et contralatéral) au 30^{ième} jour), par indication et selon l'utilisation ou non d'une protection cérébrale, de ces patients.

Dans son avis de renouvellement d'inscription du 4 février 2012³, la Commission, s'était prononcée pour un service rendu suffisant, avec une ASR de niveau V par rapport aux autres endoprothèses carotidiennes auto-expansibles, dans les indications identiques à celles retenues lors de l'inscription, sur la base des éléments suivants :

1. Données non spécifiques

- Les recommandations du National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE^{14,15} publiées en décembre 2010
- Les recommandations de 14 sociétés¹⁶ savantes américaines publiées en 2011¹⁷
- Les recommandations concernant l'angioplastie carotidienne avec pose d'une endoprothèse de l'ESO-Guidelines for Management of Ischaemic Stroke publiées en 2008, et mises à jour en 2009¹⁸)
- Les résultats de l'analyse intermédiaire à 3 ans¹⁹ de l'étude **EVA – 3S**

¹¹ Naylor AR, Bolia A, Abbott RJ, Pye IF, Smith J, Lennard N, et Al. Randomized study of carotid angioplasty and stenting versus carotid endarterectomy: a stopped trial. J Vasc Surg 1998;28 : 326-334.

¹² Brooks WH, McClure RR, Jones MR, Coleman TC, Breathitt L. Carotid angioplasty and stenting versus carotid endarterectomy: randomized trial in a community hospital. J Am Coll Cardiol 2001;38 : 1589-1595.

¹³ Massop D, Dave R, Metzger C, Bachinsky W, Solis M, Shah R, et al ; SAPPHIRE Worldwide Investigators. Stenting and angioplasty with protection in patients at high-risk for endarterectomy: SAPPHIRE Worldwide Registry first 2,001 patients. Catheter Cardiovasc Interv. 2009; 73:129-136.

¹⁴ National Institute for Clinical Excellence. Carotid artery stent placement for asymptomatic extracranial carotid stenosis. London: NICE; 2011 www.nice.org.uk

¹⁵ National Institute for Clinical Excellence. Carotid artery stent placement for symptomatic extracranial carotid stenosis. London: NICE; 2011 www.nice.org.uk

¹⁶ American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Stroke Association, American Association of Neuroscience Nurses, American Association of Neurological Surgeons, American College of Radiology, American Society of Neuroradiology, Congress of Neurological Surgeons, Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of endovascular Interventional Surgery, Society for Vascular Medicine, and Society for Vascular Surgery

¹⁷ ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS 2011 Guideline on the Management of Patients With Extracranial Carotid and Vertebral Artery Disease. A Report Journal of the American College of Cardiology. 2011; 57; 8; 16-94

¹⁸ http://www.eso-stroke.org/pdf/ESO%20Guidelines_update_Jan_2009.pdf

¹⁹ Arquizan C, Trinquart L, et Al. Restenosis is more frequent after carotid stenting than after endarterectomy. The EVA-3S Study Stroke. 2011 ; 42: 1015-1020

Certaines parties du document ne sont pas lisibles car le demandeur a souhaité que certaines données commerciales et industrielles demeurent confidentielles

- Les résultats intermédiaires de l'étude **ICSS**²⁰ (International Carotid Stenting Study) prospective, internationale, multicentrique, randomisée, contrôlée, incluant 1 733 patients.

2. Données spécifiques à PRECISE PRO RX

- Les résultats à 3 ans de l'étude **SAPPHIRE**²¹

La Commission avait constaté l'absence de résultats de l'étude post-inscription et avait maintenu sa demande de données complémentaires.

04.1.1.2. NOUVELLES DONNÉES NON SPÉCIFIQUES

Les nouvelles données non spécifiques soutenant la demande sont :

- les résultats à long terme de l'étude **EVA-3S**²² (suivi médian 7,1 ans) (randomisée, prospective, ouverte, multicentrique),
- les résultats à long terme de l'étude **ICSS**²³ (prospective, ouverte, randomisée, multicentrique) (suivi médian 4,2 ans),
- les résultats à long terme de l'étude **CREST**²⁴ (prospective randomisée, multicentrique) (suivi jusqu'à 10 ans),
- les résultats intermédiaires de l'étude **ACST-2**²⁵ (prospective, randomisée, multicentrique) (suivi jusqu'à 5 à 10 ans),
- 22 méta-analyses non retenues en raison d'objectifs et de populations différents des indications retenues par la Commission et du manque de spécificité des méta-analyses présentées.

❶ Sténoses athéroscléreuses symptomatiques

Les résultats à long terme des 2 études contrôlées, randomisées **EVA-3S**²² et **ICSS**²³ ayant pour objectif de comparer l'endartériectomie à l'angioplastie avec pose d'une endoprothèse chez des patients ayant une sténose artérioccléreuse symptomatique de la carotide ($\geq 60\%$ pour **EVA-3S** ou $> 50\%$ pour **ICSS**) sont disponibles.

- L'étude **ICSS**²³ contrôlée, multicentrique (50 centres), randomisée, en ouvert, avait inclus 1 713 patients (855 (49 %) dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse et 858 (51 %) dans le groupe endartériectomie). Le critère de jugement principal était le taux de mortalité ou le taux d'AVC fatals ou handicapants. La durée de suivi prévue était de 5 ans mais avait été étendue à 10 ans chez les patients qui le voulaient. Les patients étaient suivis avec une durée médiane de 4,2 ans (interquartile 3,0 – 5,2). La durée de suivi ne différait pas entre les groupes de traitement. La différence des taux d'AVC fatals ou invalidants à la fin du suivi n'était pas statistiquement significative entre les 2 groupes (52/853 avec un risque cumulé à 5 ans de 6,4 % dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse et de 49 événements chez 857 patients avec un risque cumulé à 5 ans de 6,5 % dans le groupe endartériectomie, HR = 1,06 ; IC 95% [0,72-1,57], p=NS). Le nombre d'AVC tout type était significativement plus important dans le groupe

²⁰ International Carotid Stenting Study investigators: Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients with symptomatic carotid stenosis (International Carotid Stenting Study): an interim analysis of a randomised controlled trial. *Lancet*. 2010 ; 375:985-997.

²¹ Gurm HS, Yadav JS, Fayad P, Katzen BT, Mishkel GJ, Bajwa TK et al;SAPPHIRE Investigators. Long-term results of carotid stenting versus endarterectomy in high-risk patients. *N Engl J Med*. 2008; 358:1572-1579.

²² Mas JL, Arquizan C, Calvet D, Viguier A, Albucher JF et al, Long term follow-up study of endarterectomy versus angioplasty in patients with symptomatic severe carotid stenosis trial, *Stroke*, 2014, 45:2750-2756.

²³ Bonati LH, Dobson J, Featherstone RL, Ederle Jvan der Worp HB et al, Long-term outcomes after stenting versus endarterectomy for treatment of symptomatic carotid stenosis: the international carotid stenting study (ICSS) randomized trial, *Lancet* 2015, 385 :529-538.

²⁴ Brott TG, Howard G, Roubin GS, Meschia JF, Moskey A et al, Long-term results of stenting versus endarterectomy for carotid artery stenosis, *N Engl J Med*. 2016;374:1021-1031.

²⁵ Halliday A, Bilbulia R, Gray W, Naughten A, den Hartog A, et al, ACST-2 Collaborative group, Status update and interim results from the asymptomatic carotid surgery trial-2 (ACST-2), *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2013, 46 :510-518.

Certaines parties du document ne sont pas lisibles car le demandeur a souhaité que certaines données commerciales et industrielles demeurent confidentielles

angioplastie avec pose d'une endoprothèse par rapport au groupe endartériectomie (119 AVC observés chez 853 patients *versus* 72 chez 857 patients, risque cumulé à 5 ans 15,2 % vs 9,4 %, HR = 1,71 ; 95%IC [1,28-2,30], p<0,001). La mortalité toute cause ne différait pas entre les groupes de traitement (tableau 1).

- L'étude française **EVA-3S**²² avait inclus 527 patients (262 (49,7%) dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse et 265 (50,3%) dans le groupe endartériectomie). Le critère de jugement principal était le taux d'AVC et de décès dans les 30 jours suivants la procédure. Pour le suivi à long terme, le critère de jugement composite associait le taux d'AVC ipsilatéral après la randomisation ou d'AVC (ipsi ou controlatéral) ou le décès.

En 2005, cette étude devant inclure initialement 900 patients avait été prématurément interrompue par le Comité de surveillance en raison d'un nombre significativement plus important d'AVC et de décès à J 30 dans le groupe angioplastie : 9,6 % contre 3,9 % : Odds Ratio (OR) = 2,5 (IC95 % [1,2 – 5,1]). Cette différence était associée à un nombre d'AVC plus important dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse alors que la mortalité était identique entre les 2 groupes. La publication de Mas et al²² rapporte les résultats avec un suivi médian de 7,1 ans (interquartile 5,0 – 8,8). Les données de suivi ont été collectées de manière rétrospective par téléphone, à partir du dossier médical des patients, du registre des décès, entre décembre 2011 et décembre 2012. Le questionnaire (verifying stroke-free status) était utilisé.

Seize patients étaient perdus de vue ou avaient refusé un suivi à long terme dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse, et 18 dans le groupe endartériectomie.

À 5 ans, 29 AVC ipsilatéraux après la randomisation ou AVC durant la procédure ou décès s'étaient produits dans le bras angioplastie avec pose d'une endoprothèse et 16 dans le groupe endartériectomie (taux cumulé d'évènements de 11 % IC95 % [7,9 – 15,2] *versus* 6,3 % IC95 % [4,0 – 9,8]). La différence des risques à 5 ans était de 4,7 % et le nombre de sujets nécessaires de traiter pour éviter un évènement était de 21,3. Le hazard ratio (HR) était de 1,85 IC95 % [1,00 – 3,40], p = 0,04.

À 10 ans, 30 AVC ipsilatéraux après la randomisation ou AVC durant la procédure ou décès s'étaient produits dans le bras angioplastie avec pose d'une endoprothèse et 18 dans le groupe endartériectomie (taux cumulé d'évènements de 11,5 % IC95 % [8,2 – 15,9] *versus* 7,6 % IC95 % [4,9 – 11,8]). Le HR était de 1,70 IC95 % [0,95 – 3,06], p = NS.

À 5 ans et 10 ans, le taux cumulé de décès était identique entre les 2 groupes de traitement : 22,1 % IC95 % [17,5 – 27,5] dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse *versus* 20,8 % IC95 % [0,74 – 1,56] dans le groupe endartériectomie, p = NS à 5 ans et 39 % IC95 % [32,5 – 45,9] dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse *versus* 38,7 % IC95 % [32,5 – 45,3] dans le groupe endartériectomie, p = NS à 10 ans)).

À 10 ans, 7 patients avaient une resténose de la carotide ≥ 70 % (dont 1 occlusion) dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse et 12 patients (dont 3 occlusions) dans le groupe endartériectomie (HR = 0,58 (0,23 -1, 48), p = NS) (tableau 1).

Les résultats à long terme de ces 2 études sont résumés dans le tableau 1 :

Tableau 1 : Résultats à long terme des études EVA-3S et ICSS

Auteur principal, année	Indications ou critères d'inclusion	Interventions		30 jours				Suivi 5 ans		Suivi 10 ans	
		Types	n	Mortalité toute cause	AVC	AVC invalidants + décès	TCMM	AVC ipsilatéral après la randomisation ou AVC durant la procédure ou décès Risque cumulé [IC95%]]	Décès Risque cumulé [IC95%]]	AVC ipsilatéral après la randomisation ou AVC durant la procédure ou décès Risque cumulé [IC95%]]	Décès Risque cumulé [IC95%]]
EVA 3S^{9,22} Suivi médian=7.1 ans	Age ≥ 18 ans Sténose ≥ 60 % Symptomatique (AIT ou AVC < 120 jours) Athéroscléreuse	Chirurgie	259	3 (1,2 %)	7 (2,7 %)	4 (1,5 %)	10 (3,9 %)	6,3% [4,0 – 9,8]	22,1% [17,5 – 27,5]	7,6% [4,9 – 11,8]	38,7% [32,5 – 45,3]
	Protection cérébrale recommandée mais non obligatoire Expérience des poseurs > 12 angioplasties carotidiennes avec stent ou > 35 angioplasties avec stent des troncs supra-aortiques dont au moins 5 stents carotidiens	Endovasculaire	261	2 (0,8 %) RR 0,7 [0,1 ; 3,9], p = NS	23 (8,8 %) RR 3,3 [1,4 ; 7,5], p = 0,04	9 (3,4 %) RR 2,2 [0,7 ; 7,2], p = NS	25 (9,6 %) RR = 2,5 [1,2 – 5,1] p = 0,01	11,0 % [7,9 – 15,2] HR = 1,85 IC95 % [1,00 – 3,40], p = 0,04	20,8 % [16,4 – 26,1] HR = 1,08 IC95 % [0,74 – 1,56], p = NS	11,5 % [8,2 – 15,9] HR -1,70 IC95 % [0,95 – 3,06], p = NS	39,0 % [32,5 – 45,9] HR = 1,00 IC95 % [0,75 – 1,33] , p = NS
ICSS²³ Suivi médian 4,2 ans (interquartile 3,0 – 5,2).	Age > 40 ans Sténose > 50 % Symptomatique (AIT ou AVC < 12 mois) Athéroscléreuse	Chirurgie	857	4/821 (0,5 %)	27/821 (3,3 %)	26/821 (3,1 %)	28 /821 (3,4 %)	7,2 % (0,9)	17.2% (1.5)	NR	NR
	Protection cérébrale recommandée mais non obligatoire Expérience des poseurs > 50 angioplasties carotidiennes avec stent et > 50 interventions au niveau de la carotide	Endovasculaire	853	11/828 (1,3 %) RR 2,73 [0,87 ; 8,53], p = NS (analyse PP)	58/828 (7,0 %) RR 2,13 [1,36 ; 3,33], p = 0,001 (analyse PP)	18/828 (2,2 %) RR 1,43 [0,79 ; 2,59], p = NS (analyse PP)	61/828 (7,4 %) RR 2,16 [1,40 ; 3,34], p = 0,0004 (analyse PP)	11,8 % (1,2) HR= 1.72 IC 95 % [1.24 ; 2.39], p<0,01	17.4% (1.5) HR= 1.17 [0.92 ; 1.48], p = NS		

Certaines parties du document ne sont pas lisibles car le demandeur a souhaité que certaines données commerciales et industrielles demeurent confidentielles

② Sténoses athéroscléreuses symptomatiques et asymptomatiques

L'étude **CREST**²⁴ contrôlée, randomisée prospective, multicentrique (108 centres aux États-Unis et au Canada) avait pour objectif de comparer l'angioplastie avec pose d'une endoprothèse à la chirurgie chez des patients ayant une sténose carotidienne symptomatique²⁶ (sténose > 50 %) ou asymptomatique (sténose > 70 %). Entre décembre 2000 et juillet 2008, 2 502 patients étaient randomisés (dont 47 % étaient asymptomatiques) : 1 262 dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse et 1 240 dans le groupe chirurgie. Un consentement pour le suivi à long terme était obtenu pour 1 607 patients (195 refus de participer, 276 ont quitté l'étude initiale, 187 décès, 76 avaient fini l'essai avant le début du suivi à long terme et 161 avaient déjà connu un événement). Le critère de jugement principal était un critère composite associant le taux d'accidents vasculaires cérébraux (AVC), d'infarctus du myocarde (IDM) et de décès durant la période périprocédurale²⁷ ou les AVC ipsilatéraux jusqu'à 10 ans suivant la randomisation.

Une protection cérébrale était utilisée chez 96,1% des patients traités. L'endoprothèse utilisée dans cette étude était l'endoprothèse RX ACCULINK.

La durée de suivi médiane était de 7,4 ans.

Durant la période périprocédurale ainsi qu'à 10 ans les taux d'AVC, d'IDM et de décès ne différaient pas de manière significative entre les groupes (tableau 2).

Tableau 2 : Résultats sur le critère de jugement principal jusqu'à 10 ans

Nombre de patients	de	Période de pénprocédure				Période de suivi (10 ans) + période pénprocédurale			
		Angioplastie carotidienne (N = 1262)	Endartériectomie (N=1240)	HR	p	Angioplastie carotidienne (N = 1262)	Endartériectomie (N=1240)	HR	p
Critère principal d'évaluation		66 (5,2 %)	56 (4,5 %)	1,18 (0,82 ; 1,68)	NS	108 (11,8%)	97 (9,9%)	1,10 (0,83 ; 1,44)	NS
n (% IC95 %)		[4,0 – 6,4]	[3,3 – 5,7]			[9,1 – 14,8]	[7,9 – 12,2]		

L'analyse en sous-groupe ne mettait pas en évidence de différence sur le critère de jugement principal en fonction du statut (symptomatique ou non) de la sténose (HR asymptomatique 0,99 IC95 % [0,64 – 1,52] versus HR symptomatique 1,17 IC95 % [0,82 – 1,66], p = NS).

Les taux d'accidents vasculaires cérébraux (AVC), de décès durant la période périprocédurale ou les AVC ipsilatéraux jusqu'à 10 ans suivant la randomisation étaient significativement plus importants dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse par rapport au groupe endartériectomie (HR= 1,37 IC 95 % [1,01 – 1,86], p = 0,04). Cette différence était principalement due aux événements périprocéduraux (parmi les 98 AVC ou décès, 55 se sont produits durant la période périprocédurale).

③ Sténose athéroscléreuses asymptomatiques

- L'étude **ACST-2**²⁵ (Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2) prospective, randomisée, multicentrique (68 centres à travers 23 pays) avait pour objectif de comparer les risques péri procéduraux et l'efficacité à long terme (5 ans) de l'angioplastie carotidienne avec pose d'une endoprothèse à l'endartériectomie dans la prévention de l'AVC chez les patients asymptomatiques ayant une sténose carotidienne serrée nécessitant une revascularisation.
- Les critères de jugement principaux étaient les risques périprocéduraux (à 1 mois) d'AVC, de décès ainsi que le taux d'infarctus du myocarde, d'AVC fatal ou invalidant survenus sur le long terme (5 ans ou plus).

²⁶ patients ayant un accident ischémique transitoire (AIT), une amaurose fugace, ou un AVC mineur non invalidant) dans les 180 jours avant la randomisation

²⁷ si la procédure était réalisée dans les 30 jours suivant la randomisation : la période de périprocédurale était la période entre la randomisation et 30 jours après la procédurale

Si la procédure était réalisée après les 30 jours suivant la randomisation : la période de périprocédurale était la période comprise entre la randomisation et 36 jours après la randomisation

Les principaux critères d'inclusion étaient les suivants :

- Patients ayant une sténose de la carotide détectable par échographie sans symptôme au niveau du territoire carotidien ipsilatéral dans les 6 derniers mois et sans antécédents d'intervention sur la carotide ipsilatérale.
- Patients éligibles à l'angioplastie carotidienne et l'endartériectomie
- Espérance de vie ≥ 5 ans
- Patients ayant débuté un traitement médicamenteux approprié et remis de toute intervention coronarienne.

Entre février 2008 et septembre 2012, 986 patients (69,7 % hommes / 30,3 % femmes, âge moyen $68,7 \pm 8,1$ ans) étaient inclus, 493 patients dans chaque groupe. Le pourcentage de cross-over était de 1,4 % (4 patients du groupe endartériectomie traités avec une endoprothèse et 7 patients du groupe endoprothèse traités par chirurgie). La majorité des patients (947 (96 %)) avait une sténose > 70 %.

Les résultats intermédiaires à 1 mois sont disponibles pour 691 patients (343 patients dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse et 348 dans le groupe chirurgie).

Les endoprothèses utilisées étaient CAROTID WALLSTENT MONORAIL, **PRECISE**, PROTEGE RX, CRISTALLO, IDEALE, RX ACCULINK, XACT, VIVEXX, ADAPT.

A 30 jours, 2 AVC fatals étaient rapportés et 4 AVC non fatals. Les résultats sur le critère de jugement principal sont détaillés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Évènements indésirables majeurs survenus à 30 jours

	N (n = 691)
AVC	20 (2,9 %)
Fatal	2 (0,3 %)
Invalidant	4 (0,6 %)
Non invalidant (Exclu les AIT)	14 (2,0 %)
Infarctus du myocarde (IDM)	4 (0,6 %)
Fatal	1 (0,2 %)
Non fatal	3 (0,4 %)
Évènements vasculaires qui ont (éventuellement) conduit à un décès ou un AVC invalidant	7 (1,0 %)
AVC, IDM ou décès en lien avec l'évènement	24 (3,5%)
Décès probablement sans lien avec un AVC, IDM ou sans lien avec la procédure	2 (0,3 %)

Les résultats de cette étude sont des résultats intermédiaires, seuls 986 patients ont été inclus et 691 (70,0 %) ont été suivis à 1 an. Les résultats comparant l'angioplastie avec pose d'une endoprothèse à la chirurgie ne sont pas décrits.

04.1.1.3. NOUVELLES DONNÉES SPÉCIFIQUES

Les nouvelles données spécifiques soutenant la demande sont :

- Le registre rétrospectif japonais **CASCARD**²⁸ incluant 704 patients,
- Le registre américain **CARE**²⁹ (Carotid Artery Revascularization and Endarterectomy) incluant 14 343 patients ayant une angioplastie avec pose d'une endoprothèse,
- Le registre **SAPPHIRE Worldwide** incluant 21 008 patients : seuls les résultats présentés à la conférence annuelle Vascular InterVentional Advances (VIVA) sous forme d'une présentation powerpoint sont disponibles, ce registre n'est pas retenu,
- Les résultats de l'étude post-inscription à partir des bases médico-administratives de l'Assurance Maladie.

❶ L'étude **CASCARD**²⁸ est un registre rétrospectif, multicentrique (55 centres), conduit par les cardiologues observationnels et ayant pour objectif d'évaluer l'angioplastie avec pose d'une endoprothèse au Japon chez des patients ayant au moins un facteur de risque élevé pour la chirurgie. Le diamètre de la carotide devait être compris entre 5 et 9 mm et une sténose symptomatique > 50 % et une sténose asymptomatique > 80 %.

Les cardiologues interventionnels devaient avoir effectué au moins 200 angioplasties coronaires et avoir réalisé le programme de formation.

Le critère de jugement principal était le taux événements indésirables majeurs (MAE) incluant la mortalité toute cause, le taux d'infarctus du myocarde et le taux d'AVC ischémique à 30 jours.

Entre avril 2008 et mars 2010, un total de 704 cas (âge moyen 74 ± 8 ans ; 101 (14 %) de femmes) ont été inclus dans 55 centres. Quatre cent trente-huit (62 %) patients étaient asymptomatiques et 257 (37 %) étaient symptomatiques. Une protection cérébrale (ANGIOGUARD) était utilisée chez tous les patients, la protection a passé la lésion dans 701 cas (99,6 %). Le dispositif PRECISE était utilisé chez 704 patients.

²⁸ Ikari Y, Misumi K, Yokoi H *et al.* Initial results of carotid artery stenting in Japan. *Cardiovasc Interv Ther.* 2013 ;281:37-44.

²⁹ Giri J, Kennedy KF, Weinberg I, *et al.* Comparative effectiveness of commonly used devices for carotid artery stenting: an NCDR Analysis (National Cardiovascular Data Registry) *JACC Cardiovasc Interv.* 2014 7:171-177.

Les résultats sur le critère de jugement principal sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4 : Résultats clinique à 30 jours (registre CASCARD)

Nombre de patients	Total N = 704	Asymptom atiques N = 438	Symptom atiques N = 257	Non spécifies N = 9	p (symptoma tique vs asymptom atique)
MAE à 30 jours	26 (3, 7 %)	12 (2,7 %)	14 (5,5 %)	0	NS
Décès	2 (0, 3 %)	1 (0, 2 %)	1 (0, 4 %)	0	NS
Infarctus du myocarde	0	0	0	0	
AVC					
Quel qu'il soit	24 (3, 4 %)	11 (2, 5 %)	13 (5, 1 %)	0	NS
Ipsilatéral majeur	3 (0, 4 %)	1	2	0	
Non ipsilatéral majeur	1 (0, 1 %)	1	0	0	
Ipsilatéral mineur	17 (2, 4 %)	7	10	0	
Non ipsilatéral mineur	3 (0, 4 %)	2	1	0	
Survenue d'un AVC		NR	NR	NR	
Au bloc	11 (46 %)				
Dans les 24 h post-procédure	8 (33 %)				
Après 24 h post-procédure	5 (21 %)				
Décès ou AVC périprocédural	21 (3,0 %)				
Décès ou AVC à 30 jours	26 (3,7 %)	12 (2,7 %)	14 (5,5 %)	0	NS
AIT	15 (2,1 %)	9 (2,1 %)	6 (2,3 %)	0	NS
Thrombose sur stent	1 (0,1 %)	1 (0,2 %)	0	0	NS
Saignement majeur	4 (0,6 %)	0	4 (1,6 %)	0	0,0088
Hypotension sévère	74 (11 %)	47 (11 %)	27 (11 %)	0	NS
Bradycardie	72 (10 %)	51 (12 %)	21 (8 %)	0	NS
Syndrome d'hyperperfusion	1 (0,1 %)	0	1 (0,4 %)	0	NS
Suspicion de syndrome d'hyperperfusion	6 (0,9 %)	3 (0,7 %)	3 (1,2 %)	0	NS

Les limites de cette étude reposent sur son caractère rétrospectif, exposant notamment à des biais de sélection. Les opérateurs étaient sélectionnés et devaient avoir suivi un programme de formation.

● The **CARE**²⁹ (Carotid Artery Revascularisation and Endarterectomy) est un registre américain enregistrant l'ensemble des patients ayant effectué une procédure de revascularisation (chirurgie ou angioplastie) associée à une sténose de la carotide.. L'objectif de cette analyse publiée en 2014 était de décrire l'utilisation et les résultats des différents systèmes de stenting carotidiens (stents associés à leurs dispositifs de protection embolique) approuvés aux États-Unis notamment ACCULINK/ACCUNET (ABBOTT), XACT/EMBOSHIELD (ABBOTT), PRECISE/ANGIOGUARD (CORDIS), THE PROTEGE/SPIDERFX (EV3) et WALLSTENT /FILTERWIRE (BOSTON SCIENTIFIC). Entre le 1 janvier 2007 et le 31 mars 2012, 12 135 procédures d'angioplastie avec pose d'une endoprothèse consécutive ont été réalisées et enregistrées. Le critère de jugement principal était l'incidence des événements indésirables majeurs intra-hospitaliers (AVC et mortalité toute cause).

Les dispositifs utilisés étaient les suivants :

SteNt	N (%)
ACCULINK/ACCUNET	N = 2 617, 21.6%
XACT/EMBOSHIELD	N = 3 507, 28.9%
PRECISE/ANGIOGUARD	N = 2 696, 22.2%
PROTÉGÉ/SPIDERFX	N = 453, 3.7%
WALLSTENT/FILTERWIRE	N = 213, 1.8%

L'endoprothèse était utilisée en association avec une protection cérébrale dans 72,7 % des cas.

Les caractéristiques des patients inclus étaient les suivantes :

Tableau 5 : Caractéristiques des patients inclus dans l'étude CARE

	ACCUNET/ACCULINK (n = 2 617)	ANGIOGUARD/PRECISE (n = 2 696)	EMBOSHIELD/XACT (n = 3 507)	p
Démographiques				
Age, années	71,2 ± 10,0	71,1 ± 10,6	70,1 ± 9,9	<0,001
Sexe				NS
Homme	1 637 (62,6)	1 693 (62,8)	2 184 (62,3)	
Femme	980 (37,4)	1 003 (37,2)	1 323 (37,7)	
Radiothérapie cervicale	159 (6,1)	159 (5,9)	182 (5,2)	NS
Antécédents de chirurgie du cou	173 (6,6)	157 (5,8)	181 (5,2)	NS
Antécédents cardiaques				
Maladie cardiaque ischémique	1 610 (61,5)	1 505 (55,8)	1 840 (52,5)	<0,001
Arrêt cardiaque	455 (17,4)	466 (17,3)	618 (17,6)	NS
Fibrillation atriale ou flutter	300 (11,5)	384 (14,3)	427 (12,2)	0 006
Antécédents neurologiques et facteurs de risqué pré-procédure				
Démence ou Alzheimer	75 (2,9)	93 (3,4)	108 (3,1)	NS
Antécédents AIT	791 (30,2)	827 (30,7)	1,042 (29,7)	NS
Antécédents d'AVC ischémique	384 (14,7)	408 (15,1)	442 (12,6)	0 008
Score total pré-procédure échelle NIH stroke	0,7 ± 2,0	0,7 ± 2,0	0,7 ± 2,1	NS
Procédure				
Vaisseau cible carotidien, droit	1 288 (49,2)	1 335 (49,5)	1 745 (49,8)	NS
Chirurgie cardiaque urgente dans les 30 jours	68 (2,8)	94 (3,6)	126 (3,7)	NS
Lésion symptomatique dans les derniers 6 mois	979 (37,4)	1 055 (39,1)	1 279 (36,5)	NS
Resténose du vaisseau cible après CAS antérieur	69 (2,6)	51 (1,9)	93 (2,7)	NS
Resténose du vaisseau cible après CEA antérieur	386 (14,7)	500 (18,5)	421 (12,0)	<0,001
Occlusion de l'artère carotide contralatérale	273 (10,4)	283 (10,5)	352 (10,0)	NS

Un test d'interaction sur le caractère symptomatique/asymptomatique pour les différents systèmes s'est avéré négatif (p interactions =0,76).

Les résultats sur le critère de jugement principal survenant à l'hôpital et à 30 jours sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Tableau 6 : Taux d'AVC et de décès à l'hôpital et à 30 jours

	Accunet/Acculink	Angioguard/Precise	Emboshield/Xact	p Value	p value ajustée
A l'hôpital	n = 2 617	n = 2 696	n = 3 507		
Décès/AVC	46 (1,8)	68 (2,5)	68 (1,9)	NS	
Décès	8 (0,3)	10 (0,4)	13 (0,4)	NS	
AVC	42 (1,6)	63 (2,3)	58 (1,7)	NS	
A 30 jours	n = 1 981	n = 2 294	n = 2 598		
Décès/AVC	63 (3,2)	103 (4,5)	88 (3,4)	0,044	NS
Décès	15 (0,8)	19 (0,8)	16 (0,6)	NS	NS
AVC	53 (2,7)	90 (3,9)	76 (2,9)	0,043	NS

L'endoprothèse PRECISE associée au système de protection cérébrale était associée à un taux d'AVC significativement plus important que l'endoprothèse XACT associée à EMBOSHIELD (2,3 % *versus* 1,7 % ; $p = 0,02$), cette différence n'était pas significative par rapport à RX ACCULINK associée à RX ACCUNET.

Dans les analyses ajustées, les différences entre PRECISE/ANGIOGUARD et ACCUNET/ACCULINK (odds ratio [OR]: 1,48, 95% IC: 0,89 à 2,47; $p = NS$), PRECISE/ANGIOGUARD et XACT/EMBOSHIELD (OR= 1,16, 95% IC : 0,77 à 1,76 $p=0,38$), et XACT/EMBOSHIELD et ACCUNET/ACCULINK (OR= 1,28, 95% IC: 0,82 à 1,97; $p=NS$) étaient non significatives.

③ Résultats de l'étude post-inscription demandée par la CNEDIMTS

Il s'agit d'une étude de cohorte observationnelle, longitudinale et multicentrique, réalisée à partir des données du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM). Cette étude est une analyse rétrospective de ces données. L'objectif de l'étude était d'une part d'évaluer le taux cumulé de morbi-mortalité à 30 jours, d'autre part de décrire les caractéristiques des patients et des centres dans lesquels une endoprothèse a été implantée sur une période donnée. La population de l'étude était constituée de l'ensemble des patients hospitalisés entre le 1^{er} juillet 2011 et le 30 novembre 2013 (sans conditions d'âge) ayant bénéficié de l'implantation d'une endoprothèse carotidienne au cours d'un séjour hospitalier (7 endoprothèses étaient inscrites sur la LPPR au début de l'étude : PRECISE RX, **PRECISE PRO RX**, RX ACCULINK, XACT, BARD VIVEXX, CAROTID WALLSTENT MONORAIL et PROTEGE RX). La pose d'une endoprothèse carotidienne a été identifiée par la présence d'un séjour hospitalier au cours duquel au moins un acte médical classant CCAM (correspondant à une dilatation intraluminale de l'artère carotide avec pose d'endoprothèse : codes EBAF001, EBAF010, EBAF011) a été réalisé.

Les critères de non inclusion étaient les suivants, patients :

- Pour lesquels aucun code LPPR faisant référence aux 7 endoprothèses de l'étude n'a été identifié dans les données PMSI (critère de non éligibilité),
- Ayant reçu une des 7 endoprothèses étudiées en dehors de la période de l'étude,
- N'ayant pas d'acte de pose PMSI pour les endoprothèses identifiées dans le DCIR.

Le critère de jugement principal retenu par le Comité scientifique était le taux cumulé de morbi-mortalité au 30^{ème} jour suivant la sortie de l'hôpital, défini par la mortalité toutes causes et la survenue d'un accident vasculaire cérébral³⁰ ischémique dans les 30 jours suivant la pose d'une endoprothèse.

³⁰ AVC ischémique défini par la présence durant le séjour initial ou lors de toute ré-hospitalisation dans les 30 jours d'un des codes CIM-10 I63-I64 dans le diagnostic principal

Les critères secondaires suivants ont également été colligés:

- les caractéristiques des patients implantés (âge, sexe, comorbidités, antécédents cardiovasculaires).
- les comorbidités et antécédents vasculaires identifiés grâce aux codes CIM-10 renseignés dans le PMSI (recherche des antécédents 6 mois avant l'intervention),
- le caractère symptomatique ou asymptomatique de la sténose
- les caractéristiques de l'endoprothèse et ses évolutions (codes LPP),
- le nombre d'angioplasties carotidiennes réalisées dans le centre sur la période étudiée,
- la durée du séjour,
- le taux combiné de mortalité (toutes causes) et d'AVC (ipsi- et controlatéral) à 1 an : estimation par le taux de ré-hospitalisation (incluant décès et AVC) à 1 an et le taux de décès hors hospitalisation (SNIIRAM).

La population incluse était constituée de 2 071 patients (2373 endoprothèses) (âge moyen $68,7 \pm 12,1$ ans [15,7 – 94,8 ans], 608 femmes / 1463 hommes) dans 161 centres (76 (47,2 %) établissements publics et 85 (52,8 %) établissements privés).

Le nombre de centres ayant une activité considérée comme faible³¹ était de 128/161 (79,5 %), 17 (10,6 %) avaient une activité considérée comme moyenne³², 16 (9,9 %) étaient considérés à forte activité³³. Trois cent quatre-vingt-deux (18,4 %) (âge moyen $64,0 \pm 12,4$ ans [20,5 – 93,9 ans]) patients avaient une sténose symptomatique dont 312 (81,7 %) étaient pris en charge dans des établissements publics et 1 689 (81,6 %) une sténose asymptomatique (âge moyen $69,7 \pm 11,8$ ans [15,7 – 94,8 ans]). La durée moyenne du séjour était de $6,7 \pm 12,3$ jours.

Parmi les 2 373 endoprothèses posées (2 071 patients) entre le 01/07/2011 et le 30/11/2013:

- 306 (14.8 %) endoprothèses étaient implantées dans 1 centre,
- 135 (6.52%) endoprothèses étaient implantées dans un autre centre,
- 515 (21.7 %) endoprothèses étaient implantées dans 10 centres,
- 1417 (59.7%) endoprothèses étaient implantées dans 149 centres.


Parmi les 161 centres planteurs, 3 centres réalisent en moyenne plus de 25 angioplasties par an.

³¹ < 25 endoprothèses posées sur la période de l'étude

³² 25 – 50 endoprothèses posées sur la période de l'étude

³³ > 50 endoprothèses posées sur la période de l'étude

Les inclusions ont été réalisées suivant le flowchart ci-dessous :



*pour 698 patients (70,5%) le code LPP associé était le code LPP de la ligne générique « stent aortique rénal iliaque ou fémoral » ou à la ligne générique des endoprothèses coronaires dits stents métalliques nus non résorbables. L'analyse comparative de ces 990 patients non éligibles avec ceux retenus pour l'analyse de l'étude montre qu'ils sont significativement plus jeunes (67,3 ans vs 68,7 ans ; $p < 0.01$) et présentent un taux de décès toute cause (période 01/01/2011-31/08/2015) significativement supérieur (respectivement : 23.8% vs 16.5% ; $p < 0.0001$) et un taux d'antécédents d'autres maladies cardio-vasculaires significativement inférieur (respectivement : 20.1% vs 24.2% ; $p < 0.05$). Le diabète sucré ne diffère pas significativement.

Les caractéristiques des patients à l'inclusion sont décrites dans le tableau 7 :

Tableau 7 : Caractéristiques des patients à l'inclusion

		Population totale N = 2 071	Groupe sténose symptomatique n=382 (18,4 %)	Groupe sténose asymptomatique n=1 689 (81,6 %)
Sexe	Femme	608 (29,4%)	99 (25,9%)	509 (30,1%)
Age (années)	Moyenne (ET)	68,7 (12,1)	64,0 (12,4)	69,7 (11,8)
	Médiane [Q1-Q3]	69,4 [61,5-77,9]	64,1 [56,4-73,0]	70,8 [62,7-78,4]
	Min-Max	15,7-94,8	20,5-93,9	15,7-94,8
Durée du séjour	Moyenne (ET)	6,7 (12,3)	10,7 (11,6)	5,7 (12,2)
	Médiane [Q1-Q3]	3,0 [3,0-5,0]	6,0 [3,0-13,0]	3,0 [2,0-4,0]
	Min-Max	0,0-287,0	0,0-93,0	0,0-287,0
Autres maladies cardiovasculaires		501 (24,2%)	37 (9,7%)	464 (27,5%)
Maladie coronaire		265 (12,8%)	7 (1,8%)	258 (15,3%)
Insuffisance cardiaque		29 (1,4%)	8 (2,1%)	21 (1,2%)
Artérite		247 (11,9%)	22 (5,8%)	225 (13,3%)
Diabète		401 (19,4%)	52 (13,6%)	349 (20,7%)
Fibrinolyse (le jour de la pose)		139 (6,7%)	121 (31,7%)	18 (1,1 %)

Résultats à 30 jours

Parmi les 2 071 patients, 108 patients (5,2 %) sont décédés ou ont eu un AVC dans les 30 jours suivant la pose de l'endoprothèse (critère de jugement principal). Deux patients ont fait un AVC avant de décéder. Vingt-cinq (45,4 %) des 55 patients décédés et 45 (81,8 %) des 55 patients ayant un AVC avaient une sténose symptomatique.

Tableau 8 : Résultats sur le critère de jugement principal à 30 jours

	Population Totale N=2 071	Groupe sténose symptomatique N = 382	Dont symptomatique avec fibrinolyse N = 121	Dont symptomatique sans fibrinolyse N = 261	Groupe sténose asymptomatique N = 1 689
Décès	55 (2,7 %)	25 (6,5 %)	16 (13,2 %)	9 (3,4 %)	30 (1,8 %)
AVC ischémique (diagnostic principal)	55 (2,7 %)	45 (11,8 %)	30 (24,8 %)	15 (5,7 %)	10 (0,6 %)
Décès ou AVC	108 (5,2 %)	69 (18,1 %)	45 (37,2 %)	24 (9,2 %)	39 (2,3 %)

L'analyse de l'évolution du critère de jugement principal en fonction du caractère symptomatique ou non de la sténose a mis en évidence une différence importante et significative entre les deux groupes ($p < 0,0001$).

Résultats à 1 an

1 235 patients ont été suivis à 1 an. Cent trente-neuf patients (11,3 %) sont décédés ou ont eu un AVC dans l'année suivant la pose de l'endoprothèse (5 patients ont eu un AVC avant de décéder).

Tableau 9 Résultats du critère principal et de ses critères composites à 1 an

	Population Totale N = 1 235	Groupe sténose symptomatique N = 217	Dont symptomatique avec fibrinolyse N = 62	Dont symptomatique sans fibrinolyse N = 155	Groupe sténose asymptomatique N = 1 018
Décès	98 (7,9 %)	27 (12,4%)	10 (16,1%)	17 (11,0%)	71 (7,0%)
AVC ischémique (diagnostic principal)	46 (3,7 %)	31 (14,3%)	12 (19,4%)	19 (12,3%)	15 (1,5%)
Décès ou AVC	139 (11,3 %)	57 (26,3%)	21 (33,9%)	36 (23,2%)	82 (8,1%)

Des analyses en sous-groupe en fonction du sexe, de l'âge, du type de centre, des autres maladies cardiovasculaires et de la présence d'artérite ont été menées. Les facteurs retrouvés comme associés à la survenue d'un décès de toute cause ou d'un AVC ischémique³⁴ dans les 30 jours suivant la pose d'une endoprothèse (critère de jugement principal) étaient :

- pour les patients asymptomatiques et symptomatiques, le type de centre
 - privé *versus* public, patients symptomatiques : HR= 0,314 [0,124-0,800], $p < 0,05$
 - privé *versus* public, patients asymptomatiques HR= 0,308 [0,156-0,607], $p < 0,001$;
- les antécédents d'autres maladies cardio-vasculaires (Présence vs Absence) : HR= 2,519[1,325 – 4,788] $p < 0.01$ pour les patients asymptomatiques.

Une analyse spécifique des résultats relatifs aux endoprothèse PRECISE PRO RX et PRECISE RX a été réalisée. Il s'agit d'une étude observationnelle qui rend difficile toute comparaison.

L'endoprothèse PRECISE PRO RX a été implantée chez 266 patients (90 femmes (33,8 %), d'âge moyen $62,2 \pm 13,3$ ans) dans 30 centres (11 publics (107 patients) et 19 privés (159 patients). Vingt-trois centres étaient considérés comme à faible activité (70 patients) ;

³⁴ AVC ischémique défini par la présence durant le séjour initial ou lors de toute ré-hospitalisation dans les 30 jours d'un des codes CIM-10 I63–I64 dans le diagnostic principal

11 centres avec une activité moyenne (11 patients) et 5 centres à forte activité (185 patients). Cinquante-six patients étaient symptomatiques et 210 patients étaient asymptomatiques.

L'endoprothèse PRECISE RX a été implantée chez 91 patients (27 femmes (29,7 %), d'âge moyen $62,0 \pm 15,0$ ans) dans 5 centres publics. Quatre centres étaient considérés comme à faible activité (12 patients) et 1 centre à forte activité (79 patients). Vingt-sept patients étaient symptomatiques et 64 patients étaient asymptomatiques.

Les résultats à 30 jours étaient les suivants :

Tableau 10 Résultats spécifiques à PRECISE PRO RX et PRECISE RX à 30 jours (étude post-inscription)

Résultat du critère principal et de ses critères composites à 30 jours	PRECISE PRO RX					PRECISE RX				
	Population Totale	sténose symptomatique	Dont symptomatique avec fibrinolyse	Dont symptomatique sans fibrinolyse	sténose asymptomatique	Population Totale	sténose symptomatique	Dont symptomatique avec fibrinolyse	Dont symptomatique sans fibrinolyse	sténose asymptomatique
Décès										
AVC (diagnostic principal)										
Décès ou AVC										

Les résultats à 1 an étaient les suivants :

Tableau 11 : Résultats spécifiques à PRECISE PRO RX et PRECISE RX à 1 an (étude post-inscription)

Résultat du critère principal et de ses critères composites à 1 an	PRECISE PRO RX					PRECISE RX				
	Population Totale	sténose symptomatique	Dont sténose symptomatique avec fibrinolyse	Dont sténose symptomatique sans fibrinolyse	sténose asymptomatique	Population Totale	sténose symptomatique	Dont symptomatique avec fibrinolyse	Dont symptomatique sans fibrinolyse	sténose asymptomatique
Décès										
AVC (diagnostic principal)										
Décès ou AVC										

- Les résultats de cette étude observationnelle incluant l'ensemble des patients hospitalisés entre le 1er juillet 2011 et le 30 novembre 2013 (sans conditions d'âge) et ayant bénéficié de l'implantation d'une endoprothèse carotidienne remboursée au cours d'un séjour hospitalier, ont pour source de données le SNIIRAM. La validité des données est donc dépendante de la qualité du codage. Par rapport à la demande initiale de la CNEDiMTS, les caractéristiques de l'opérateur (chirurgien vasculaire, cardiologue ou radiologue vasculaire ou neuroradiologue), la procédure d'angioplastie (protection cérébrale, traitement médical péri-procédure, durée de la procédure, durée de séjour, taux de succès technique), les indications justifiant la

mise en place d'une endoprothèse carotidienne, les caractéristiques de la sténose (étiologie, degré de sténose) n'ont pas pu être documentées.

04.1.1.4. MATÉRIOVIGILANCE

Depuis la commercialisation des endoprothèses carotidiennes PRECISE PRO RX et jusqu'au 29 mai 2016, 107 085 unités ont été vendues dans le monde. Quatre événements de matériovigilance ont été déclarés dont un en France.

Il est à noter que CORDIS a initié un rappel de lots volontaire de 179 lots de PRECISE PRO RX fabriqués entre le 27 avril 2015 et le 22 novembre 2015. Ce retrait est enregistré à l'ANSM sous le n° R1601877.

Suite à de récentes réclamations et aux investigations faites en conséquence, CORDIS a identifié que ces dispositifs pouvaient être liés à une augmentation de fréquence des difficultés de déploiement du stent. Aucune conséquence pour le patient n'a été rapportée. Dans certains cas, la séparation de parties de la gaine extérieure a rendu le déploiement du stent impossible ou partiel.

Au total, par rapport à la précédente évaluation, les résultats de l'étude post-inscription ont été fournis. La Commission souligne le nombre important de centres implantateurs (161 centres ont implanté une endoprothèse inscrite sur la LPPR dont 107 moins de 10 endoprothèses durant la période de l'étude). La Commission estime que le rapport effet thérapeutique/effets indésirables de l'endoprothèse carotidienne PRECISE PRO RX est favorable à son utilisation dans les indications retenues.

04.1.2. PLACE DANS LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

Le but de la prise en charge des patients ayant une sténose de la bifurcation carotidienne est de prévenir la survenue ou la récurrence d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique.

La prise en charge repose d'une part sur le traitement médical associant un traitement anti-agrégant plaquettaire et le contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires.

Un geste de revascularisation peut être indiqué en fonction notamment du bilan anatomique (siège et degré de la sténose, de son évolutivité) et de son caractère symptomatique ou non

Les techniques de revascularisation des sténoses de la bifurcation carotidienne disponibles sont:

- la chirurgie (essentiellement endartériectomie)
- le traitement endovasculaire (angioplastie avec pose d'une endoprothèse associée éventuellement à une protection cérébrale).
- la chirurgie

La chirurgie est réalisée selon différentes procédures chirurgicales et de protection cérébrale. Les techniques de chirurgie restauratrice sont dominées par l'endartériectomie dont les modalités sont diverses (endartériectomie avec angioplastie de fermeture veineuse ou prothétique, endartériectomie par retournement ou avec transposition sur la carotide externe).

- l'angioplastie carotidienne

L'angioplastie carotidienne est une technique en évolution depuis 15 ans.

Les premières procédures ont été réalisées simplement par angioplastie au ballonnet.

Dans un deuxième temps, elles ont été réalisées avec pose d'une endoprothèse pour réduire les risques de dissection, stabiliser la zone pariétale de l'angioplastie et réduire le risque de récurrence de sténose. Depuis quelques années, la procédure est le plus souvent accompagnée d'une protection cérébrale visant à réduire la migration d'embolies en aval du vaisseau traité.

Actuellement, toutes les angioplasties carotidiennes sont effectuées avec pose d'une endoprothèse. Les angioplasties simples au ballonnet ne sont plus réalisées. L'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée.

Le patient est traité par une association d'anti-agrégants plaquettaires associant l'aspirine et le clopidogrel pour une période minimum de 1 mois après une angioplastie à l'issue de laquelle une monothérapie sera proposée³⁵.

Contre-indications de l'angioplastie avec endoprothèse :

L'angioplastie avec endoprothèse est contre-indiquée en cas de difficultés anatomiques rendant difficile la navigation endovasculaire au niveau de la crosse aortique ou de la sténose carotidienne ainsi qu'en présence d'un thrombus au niveau de la sténose. La réalisation d'une angioplastie carotidienne avec endoprothèse est à plus haut risque chez les patients âgés de 80 ans et plus.

A. Traitement des sténoses athéroscléreuses symptomatiques:

- la chirurgie est actuellement la technique de référence.

Le bénéfice du traitement chirurgical (endartériectomie carotidienne principalement) a été démontré pour les sténoses carotidiennes symptomatiques dans les années 1990-2000 par les grandes études prospectives multicentriques **NASCET**³⁶ (incluant 2885 patients dont 659 symptomatiques $\geq 70\%$) et **ECST**³⁷ (incluant 3018 patients symptomatiques). Celles-ci ont démontré que la chirurgie carotidienne diminuait, par rapport au traitement médical seul, le risque de récurrence pour les sténoses carotidiennes symptomatiques serrées (c'est-à-dire $> 70\%$).

Les indications de la chirurgie carotidienne sont notées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 12 : Indications de la chirurgie carotidienne dans les sténoses artérioscléreuses symptomatiques³⁸

Indications de la chirurgie carotidienne	
Degré de sténose symptomatique Score « NASCET »	Indications
70 – 99%	Endartériectomie carotidienne chez les patients avec un IC non invalidant ou un AIT, de moins de 6 mois
Sténoses « sub-occlusives »	Bénéfice de l'endartériectomie carotidienne incertain
50 – 69%	Endartériectomie carotidienne possible en prenant en considération certaines caractéristiques du patient et de l'accident ischémique cérébral Le bénéfice est plus important chez les hommes, chez les patients de plus de 75 ans et, en cas d'AIT, chez les patients avec symptômes hémisphériques
< 50%	Pas d'indication chirurgicale

³⁵ Recommandations de bonne pratique concernant le bon usage des agents antiplaquettaires, ANSM/HAS, http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-07/12irp06_reco_agents_antiplaquetitaires.pdf [consulté le 01/09/2012]

³⁶ Barnett HJ, Taylor DW, Eliasziw M, Fox AJ, Ferguson GG, Haynes RB, et Al. Benefit of carotid endarterectomy in patients with symptomatic moderate or severe stenosis. N Engl J Med 1998 ; 339 : 1415-1425

³⁷ European Carotid Surgery Trialists' Collaborative Group Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST). Lancet 1998;351 : 1379-1387.

³⁸ Haute Autorité de Santé. Prévention vasculaire après un infarctus cérébral ou un accident ischémique transitoire - Actualisation. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2014. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/avc_recommandation_2014-09-25_13-08-18_537.pdf

Chez les patients atteints d'accident ischémique transitoire ou d'infarctus cérébraux modérés ou régressifs, une intervention dans les 2 semaines apporte un bénéfice par rapport à une intervention différée.

Les patients âgés de plus de 75 ans, surtout de sexe masculin, tirent un plus grand bénéfice de la chirurgie carotidienne que les patients de moins de 65 ans.

Dans les études **NASCET** et **ECST**, le TCMM (taux cumulé de morbi-mortalité à J 30) observé par les équipes chirurgicales était de l'ordre de 6%. Dans l'étude française **EVA-3S** (2006), il était de 3,9%(taux le plus faible de toutes les études randomisées).

L'angioplastie carotidienne avec pose d'une endoprothèse, réalisée en respectant les bonnes pratiques de réalisation de cet acte peut être discutée dans les conditions suivantes :

- si le chirurgien juge l'intervention contre-indiquée pour des raisons techniques ou anatomiques (paralysie récurrentielle controlatérale, immobilité du cou, trachéotomie, lésions tissulaires sévères ou sténoses carotidiennes inaccessibles) ;
- si les conditions médico-chirurgicales sont jugées à risque après discussion pluridisciplinaire, avec notamment avis du chirurgien vasculaire et consultation neurologique :
 - risque clinique : insuffisance cardiaque avec $FE \leq 30\%$, insuffisance respiratoire sévère, cardiopathie ischémique instable, cardiopathie valvulaire sévère ;
 - risque hémodynamique : occlusion de la carotide controlatérale. La présence d'une occlusion de la carotide controlatérale ne constitue pas une contre-indication à la chirurgie. Elle peut faire discuter une revascularisation avec shunt ou une angioplastie avec stent, sans qu'il y ait de preuve de la supériorité d'une de ces stratégies dans cette indication ;
 - risque thérapeutique : patients recevant déjà un traitement anti-agrégant associant aspirine et clopidogrel qui ne peut être interrompu. Cependant, ce double traitement anti-agrégant ne constitue pas une contre-indication formelle à la chirurgie et il convient de s'appuyer sur les recommandations des sociétés savantes.

L'angioplastie est indiquée pour des sténoses $> 50\%$.

B. Traitement des sténoses athéroscléreuses asymptomatiques :

- La chirurgie n'est pas indiquée pour les sténoses athéroscléreuses asymptomatiques $< 60\%$.

Elle peut être proposée pour les sténoses asymptomatiques $\geq 60\%$ en fonction de différents paramètres (espérance de vie, paramètres hémodynamiques et anatomiques, évolutivité du degré de sténose) et pour les équipes chirurgicales dont le taux attendu de morbi-mortalité à J30 est inférieur à 3%.

Les indications de la chirurgie carotidienne sont notées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 13 : Indications de la chirurgie carotidienne dans les sténoses artérioscléreuses asymptomatiques

Indications de la chirurgie carotidienne	
Degré de sténose asymptomatique Score « NASCET »	Indications
< 60%	la chirurgie n'est pas indiquée
≥ 60%	Chirurgie peut être proposée en fonction de différents paramètres (espérance de vie, paramètres hémodynamiques et anatomiques, évolutivité du degré de sténose) et pour les équipes chirurgicales dont le taux attendu de morbi-mortalité à J30 est inférieur à 3%

Le risque de présenter un infarctus cérébral ipsilatéral est estimé à 2 % par an chez les patients porteurs de sténoses asymptomatiques ≥ 60 %. Les études **ACAS**³⁹ et **ASCT**⁴⁰ ont montré une réduction du risque d'AVC à 5 ans de l'ordre de 6 % par rapport au traitement médical chez les patients porteurs de sténoses asymptomatiques ≥ 60 %.

Le bénéfice de la chirurgie ne se manifeste qu'à long terme (1 à 2 ans), alors que pour les formes symptomatiques, il apparaît précocement après l'intervention.

Ce bénéfice est moindre chez les femmes.

Il est indépendant du degré de sténose carotidienne au-delà de 60 % (contrairement au cas des sténoses symptomatiques).

Il n'existe pas d'indication démontrée à l'angioplastie avec pose d'endoprothèse pour les sténoses asymptomatiques de la carotide.

Néanmoins, exceptionnellement, si une revascularisation est jugée nécessaire (sténoses asymptomatiques ≥ 60%), une angioplastie avec stent pourrait être proposée au terme d'une discussion pluridisciplinaire au cours de laquelle le chirurgien juge l'intervention contre-indiquée. Cette décision devrait prendre en compte le risque naturel d'évolution de la maladie sous traitement médical optimal.

C. Sténoses radiques et resténoses post-chirurgicales :

Le traitement des sténoses carotidiennes radiques ou des resténoses post-chirurgicales, symptomatiques ou non, est un traitement médical, seul ou associé à un geste de revascularisation par endartériectomie ou par angioplastie avec pose d'une endoprothèse.

En pratique, la stratégie thérapeutique doit se discuter en fonction du caractère symptomatique ou non de la sténose, de son degré de sévérité, de l'espérance de vie et de paramètres anatomiques. Ce choix thérapeutique doit être discuté en concertation pluridisciplinaire, avec notamment l'avis du chirurgien vasculaire et une consultation neurologique.

*Au vu des données, la Commission estime que **PRECISE PRO RX** a un intérêt dans la stratégie thérapeutique de prise en charge des sténoses carotidiennes.*

³⁹ Halliday A, Mansfield A, Marro J, Peto C, Peto R, Potter J, *et Al.* Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. *Lancet* 2004 ; 363 : 1491-1502.

⁴⁰ Executive Committee for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study. Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. *JAMA* 1995 ; 273 : 1421-1428

04.1.3. CONCLUSION SUR L'INTÉRÊT DU PRODUIT

PRECISE PRO RX a une place dans la stratégie thérapeutique pour la prise en charge :

- **des sténoses athéroscléreuses symptomatiques (> 50 %), si le chirurgien juge l'endarterectomie contre-indiquée pour des raisons techniques ou anatomiques ou si les conditions médico-chirurgicales sont jugées à risque après discussion pluridisciplinaire avec notamment avis du chirurgien vasculaire et consultation neurologique,**
- **des sténoses athéroscléreuses asymptomatiques ($\geq$ 60 %) les endoprothèses carotidiennes sont exceptionnellement indiquées si une revascularisation est jugée nécessaire au terme d'une discussion pluridisciplinaire au cours de laquelle le chirurgien juge l'intervention contre-indiquée. Cette décision devrait prendre en compte le risque naturel d'évolution de la maladie sous traitement médical optimal,**
- **des sténoses radiques et post-chirurgicales.**

04.2. INTÉRÊT DE SANTE PUBLIQUE

04.2.1. GRAVITÉ DE LA PATHOLOGIE

Les sténoses de la carotide peuvent se compliquer d'infarctus cérébral pouvant entraîner la mort ou un handicap sévère.

Le caractère de gravité des sténoses de la carotide est fonction de leurs caractéristiques :

- Sténoses athéroscléreuses de la carotide

L'accident vasculaire cérébral constitue la première cause de handicap acquis de l'adulte, la seconde cause de démence et la troisième cause de mortalité après les cancers et l'infarctus du myocarde. En 2010, les AVC représentent 90 % des décès par maladie cérébro-vasculaire soit 28 949 décès⁴¹. Les infarctus cérébraux représentent 80 à 85 % de l'ensemble des AVC⁴².

Parmi les étiologies des infarctus cérébraux, 15 –20% sont attribués à l'athérosclérose des artères à destination encéphalique (principalement la carotide⁴³).

Le risque de récurrence d'infarctus cérébral ipsilatéral des sténoses athéromateuses symptomatiques (sténose carotidienne qui a été responsable d'un infarctus cérébral, d'un AIT ou d'un accident rétinien (amaurose transitoire ou ischémie) dans le territoire ipsilatéral d'aval) est estimé à environ 13% par an⁸.

Le risque de présenter un infarctus ipsilatéral à moyenne et longue échéance chez les patients porteurs d'une sténose asymptomatique $\geq$ 60% est estimé environ à 2% par an⁴⁴ (estimation de 11% à 5 ans pour un suivi moyen de 2,7 ans).

- Sténoses radiques et post-chirurgicales

Les sténoses post-radiothérapeutiques surviennent entre 5 et 10 ans après la radiothérapie. La morbi-mortalité des patients porteurs de sténoses radiques serait principalement de nature carcinologique.

⁴¹ Les chiffres clés de l'AVC. Ministère des affaires sociales et de la santé. <http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-cardiovasculaires/accident-vasculaire-cerebral-avc/article/les-chiffres-cles-de-l-avc> [consulté le 21 septembre 2016]

⁴² Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Prise en charge initiale des patients adultes atteints d'accident vasculaire cérébral. Aspects médicaux. Recommandations pour la pratique clinique. Paris: ANAES; 2002.

⁴³ Chaturvedi S, Bruno A, Feasby T, Holloway R, Benavente O, Cohen SN, et Al. Carotid endarterectomy--an evidence-based review: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology* 2005 ; 65 : 794-801.

⁴⁴ Executive Committee for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study. Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. *JAMA* 1995 ; 273 : 1421-1428

Le pourcentage des resténoses supérieures à 50 % après une chirurgie carotidienne serait de 10 %.

Les sténoses de la carotide sont une pathologie grave, susceptible d'entraîner une dégradation marquée de la qualité de vie et d'engager le pronostic vital.

04.2.2. ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA PATHOLOGIE

Elles siègent essentiellement au niveau de la bifurcation carotidienne ou à l'origine de la carotide interne. Elles sont fréquentes : leur prévalence pour les sténoses supérieures à 50 % est de 5 à 10 % des sujets de plus de 65 ans dans la population générale et de 20 à 30 % des patients ayant une coronaropathie ou une artériopathie des membres inférieurs symptomatiques.

04.2.3. IMPACT

Compte tenu de l'existence de 4 autres endoprothèses carotidiennes inscrites sur la LPPR et remplissant les mêmes fonctions, PRECISE PRO RX répond à un besoin déjà couvert.

04.2.4. CONCLUSION SUR L'INTÉRÊT DE SANTÉ PUBLIQUE

Les endoprothèses carotidiennes présentent un intérêt de santé publique compte tenu du caractère de gravité des sténoses carotidiennes.

En conclusion, la Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé estime que le Service Rendu est suffisant pour le renouvellement des conditions d'inscription sur la liste des Produits et Prestations prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale.

La Commission recommande une inscription sous nom de marque et retient les indications suivantes :

- **le traitement des sténoses athéroscléreuses symptomatiques (> 50 %), si le chirurgien juge l'endartériectomie contre-indiquée pour des raisons techniques ou anatomiques ou si les conditions médico-chirurgicales sont jugées à risque après discussion pluridisciplinaire avec notamment avis du chirurgien vasculaire et consultation neurologique,**
- **pour les sténoses athéroscléreuses asymptomatiques (≥ 60 %), les endoprothèses carotidiennes sont exceptionnellement indiquées si une revascularisation est jugée nécessaire au terme d'une discussion pluridisciplinaire au cours de laquelle le chirurgien juge l'intervention contre-indiquée. Cette décision devrait prendre en compte le risque naturel d'évolution de la maladie sous traitement médical optimal,**
- **le traitement des sténoses radiales et post-chirurgicales.**

05 ÉLÉMENTS CONDITIONNANT LE SERVICE RENDU

05.1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MINIMALES

Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications techniques proposées par le fabricant.

05.2. MODALITÉS D'UTILISATION ET DE PRESCRIPTION

La Commission souligne la difficulté opératoire de mise en place des endoprothèses qui doit être réservée :

- A un opérateur ayant une expérience d'au moins 25 angioplasties avec endoprothèse de la carotide.
- A des centres disposant des compétences pour pouvoir prendre en charge un accident vasculaire aigu ou disposant d'un accès à une unité spécialisée neurovasculaire. La salle interventionnelle doit disposer d'une angiographie numérisée avec capacités de soustraction, d'une table mobile et d'un arceau commandé par l'opérateur ainsi que du matériel d'anesthésie-réanimation. La présence d'un anesthésiste est recommandée.

L'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée.

06 AMÉLIORATION DU SERVICE RENDU

06.1. COMPARATEURS RETENUS

Quatre autres endoprothèses carotidiennes sont inscrites sur la LPRR dans des indications identiques à celles retenues pour l'endoprothèse carotidienne PRECISE PRO RX. Les comparateurs retenus sont donc les autres endoprothèses carotidiennes inscrites sur la LPRR et ayant des indications identiques à l'endoprothèse carotidienne PRECISE PRO RX.

06.2. NIVEAU D'ASR

En l'absence d'étude comparative, l'intérêt d'une endoprothèse carotidienne par rapport à une autre n'a pas pu être évalué.

La Commission s'est prononcée pour une absence d'Amélioration du Service Rendu (ASR V) pour l'endoprothèse PRECISE PRO RX par rapport aux autres endoprothèses carotidiennes dans les indications retenues.

07 CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DURÉE D'INSCRIPTION

07.1. CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

Actualisation des données conformément aux recommandations du guide pratique pour l'inscription au remboursement des produits et prestations.

07.2. DURÉE D'INSCRIPTION PROPOSÉE

5 ans

08 POPULATION CIBLE

La population cible correspond aux patients ayant une sténose de la bifurcation carotidienne athéroscléreuse symptomatique (> 50 %) ou asymptomatique ($\geq$ 60 %) en cas de contre-indication à la chirurgie carotidienne, ainsi que les patients ayant une sténose radique ou post-chirurgicale.

Il n'existe pas de données épidémiologiques suffisamment précises pour estimer, le nombre de patients relevant de chacune des indications retenues.

La population cible a donc été approchée à partir de la population rejointe correspondant aux patients chez lesquels un acte d'angioplastie de l'artère carotide avec pose d'une endoprothèse a été réalisé.

L'analyse des données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) par acte classant entre 2011 et 2015 est décrite dans le tableau 14 pour les actes suivants:

- **EBAF001** (Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée)
- **EBAF010** (Dilatation intraluminale de l'artère carotide commune cervicale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée)
- **EBAF011** (Dilatation intraluminale de la bifurcation carotidienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée)

Tableau 14 Nombre d'angioplasties recensées par les données du PMSI dans l'ensemble des établissements privés ou publics

	2011	2012	2013	2014	2015
EBAF001	395	483	530	445	498
EBAF010	245	214	284	276	299
EBAF011	367	329	329	334	352
Total	1007	1026	1143	1055	1149

Ainsi, sur la période 2011-2015, le nombre de séjours au cours desquels un acte d'angioplastie carotidienne avec pose d'une endoprothèse a été réalisé était compris entre 1007 et 1149 par an.

En conclusion, la population cible de l'endoprothèse PRECISE PRO RX est estimée à environ 1100 patients par an.

Référence	Mas JL, Arquizan C, Calvet D, Viguier A, Albucher JF et al. Long-term follow-up study of endarterectomy versus angioplasty in patients with symptomatic severe carotid stenosis trial , Stroke, 2014, 45:2750-2756
Type de l'étude	Étude prospective, contrôlée, ouverte, randomisée, de non infériorité.
Date et durée de l'étude	Inclusion des patients entre novembre 2000 et septembre 2005 Suivi au long terme de janvier 2008 à décembre 2012
Objectif de l'étude	Évaluation à long terme de la balance bénéfice/risque des endoprothèses carotidiennes <i>versus</i> endartériectomie pour le traitement des sténoses carotidiennes symptomatiques.
METHODE	
Critères de sélection	Critères d'inclusion patients - âgés ≥ 18 ans - ayant des antécédents d'accident ischémique hémisphérique ou rétinien ou d'AVC non invalidant dans les 120 jours précédents l'inclusion - ayant une sténose artérioscléreuse comprise entre 60 et 99 % Critères de non inclusion : - score de Rankin modifié évalué à 3 ou plus - ou pathologie carotidienne non artérosclérotique - ou sévères lésions en tandem - ou revascularisation antérieure de la sténose symptomatique - ou antécédents de troubles de l'hémostase - ou HTA ou diabète non contrôlé - ou angor instable - ou contre-indication à l'héparine, clopidogrel ou ticlopidine - ou espérance de vie < 2 ans - ou une intervention dans les 30 jours précédents ou suivants l'intervention de l'essai clinique.
Cadre et lieu de l'étude	30 centres publics et privés en France
Produits étudiés	Endoprothèses carotidiennes et protections emboliques approuvées par le comité d'accréditation sont : - CAROTID WALLSTENT - ACCULINK - PRECISE RX, - ZILVER
Critère de jugement principal	Taux de décès et d'AVC ipsi et controlatéral dans les 30 jours suivant la procédure Pour le suivi à long terme le critère de jugement principal était un critère composite associant tout AVC ipsilatéral survenant après randomisation, tout AVC périprocédural ou tout décès.
Critère(s) de jugement secondaire(s)	Critères de jugement secondaires : - tout AVC ou décès procédural - tout AVC fatal ou invalidant - décès toutes causes
Taille de l'échantillon	527 patients randomisés (265 dans le groupe endoprothèse carotidienne et 262 dans le groupe endartériectomie)
Méthode de randomisation	• Randomisation centralisée 1/1 avec un code généré par ordinateur. • Randomisation stratifiée selon le degré de la sténose (sténose ≥ 90 % ou < 90 %) et le centre. • Patients et investigateurs n'étaient pas en aveugle du traitement alloué

	Évaluation en aveugle des événements cliniques et des résultats angiographiques																																																																
Méthode d'analyse des résultats	Analyse en intention de traiter Estimation de la probabilité des événements à 5 et 10 ans estimée avec la méthode de Kaplan-Meier et des intervalles de confiance (95%) avec la formule de Rothman. Les modèles de Cox ont été utilisés pour calculer les risques relatifs et les intervalles de confiance (95%)																																																																
RESULTATS																																																																	
Nombre de sujets analysés	493 ont complété leur protocole de suivi.																																																																
Durée du suivi	Suivi médian= 7.1 années (écart interquartile 5.1–8.8 ans; maximum 12.4 ans)																																																																
Caractéristiques des patients et comparabilité des groupes	Les deux groupes étaient bien équilibrés au niveau des caractéristiques à l'inclusion à l'exception d'une plus forte proportion de patients avec des antécédents d'AVC dans le groupe endartériectomie*.																																																																
Résultats inhérents au critère de jugement principal	À 5 ans de suivi, le critère principal a été observé chez 29/265 patients dans le groupe des endoprothèses carotidiennes et 16/262 patients dans le groupe endartériectomie. Le taux cumulé était de 11,0 % dans le groupe angioplastie avec pose d'une endoprothèse <i>versus</i> 6,3 % dans le groupe endartériectomie (HR=1,85 – IC95 %=1,00-3,40 -p=0,04). À 10 ans de suivi, le critère principal a été observé chez 30 patients dans le groupe des endoprothèses carotidiennes et 18 patients dans le groupe endartériectomie. Le taux cumulé était de 11,5 % dans le groupe endoprothèse <i>versus</i> 7,6 % dans le groupe endartériectomie (HR=1,70 – IC 95 %=0,95-3,06 -p=NS). Pas de différence significative entre les groupes pour les taux d'AVC ou décès procédural, d'AVC fatal ou invalidant ou des décès toutes causes.																																																																
Résultats inhérents au(x) critère(s) de jugement secondaire(s)	<table><tr><th colspan="5">Risque cumulé à 5 ans (ITT)</th><th colspan="5">Risque cumulé à 10 ans (ITT)</th></tr><tr><th></th><th>N</th><th>Stent</th><th>N</th><th>chirurgie</th><th>HR (95% IC) p</th><th>N</th><th>Stent</th><th>N</th><th>chirurgie</th><th>HR (95% IC) p</th></tr><tr><td>Décès*</td><td>58</td><td>22,1 (17,5–27,5)</td><td>54</td><td>20,8 (16,4–26,1)</td><td>1,08 (0,74–1,56) P=NS</td><td>92</td><td>39,0 (32,5–45,9)</td><td>93</td><td>38,7 (32,5–45,3)</td><td>1,00 (0,75–1,33) p = NS</td></tr></table> *Pas de différence significative dans les causes de décès retrouvés (p=NS). Le taux de revascularisation et d'IDM ne différait pas entre les groupes de traitement au cours du suivi. A 10 ans, 7 patients avaient une resténose de la carotide ≥ 70 % dans le groupe endoprothèse carotidienne versus 8 Le taux de resténose de la carotide ≥ 70 % au cours du suivi est rapporté dans le tableau ci-dessous : <table><tr><th colspan="5">Risque cumulé à 5 ans (PP)</th><th colspan="5">Risque cumulé à 10 ans (PP)</th></tr><tr><th></th><th>N</th><th>Stent</th><th>N</th><th>chirurgie</th><th>HR (95% IC) p</th><th>N</th><th>Stent</th><th>N</th><th>chirurgie</th><th>HR (95% IC) p</th></tr><tr><td>resténose de la carotide ≥ 70 %</td><td>5</td><td>2,3 (1,2–5,0)</td><td>10</td><td>4,2 (2,4–7,4)</td><td>0,52 (0,18–1,51) P = NS</td><td>7*</td><td>5,0 (2,5–11,2)</td><td>12**</td><td>8,3 (4,4–16,0)</td><td>0,58 (0,23–1,48) p = NS</td></tr></table> *dont 1 occlusion - ** dont 3 occlusions	Risque cumulé à 5 ans (ITT)					Risque cumulé à 10 ans (ITT)						N	Stent	N	chirurgie	HR (95% IC) p	N	Stent	N	chirurgie	HR (95% IC) p	Décès*	58	22,1 (17,5–27,5)	54	20,8 (16,4–26,1)	1,08 (0,74–1,56) P=NS	92	39,0 (32,5–45,9)	93	38,7 (32,5–45,3)	1,00 (0,75–1,33) p = NS	Risque cumulé à 5 ans (PP)					Risque cumulé à 10 ans (PP)						N	Stent	N	chirurgie	HR (95% IC) p	N	Stent	N	chirurgie	HR (95% IC) p	resténose de la carotide ≥ 70 %	5	2,3 (1,2–5,0)	10	4,2 (2,4–7,4)	0,52 (0,18–1,51) P = NS	7*	5,0 (2,5–11,2)	12**	8,3 (4,4–16,0)	0,58 (0,23–1,48) p = NS
Risque cumulé à 5 ans (ITT)					Risque cumulé à 10 ans (ITT)																																																												
	N	Stent	N	chirurgie	HR (95% IC) p	N	Stent	N	chirurgie	HR (95% IC) p																																																							
Décès*	58	22,1 (17,5–27,5)	54	20,8 (16,4–26,1)	1,08 (0,74–1,56) P=NS	92	39,0 (32,5–45,9)	93	38,7 (32,5–45,3)	1,00 (0,75–1,33) p = NS																																																							
Risque cumulé à 5 ans (PP)					Risque cumulé à 10 ans (PP)																																																												
	N	Stent	N	chirurgie	HR (95% IC) p	N	Stent	N	chirurgie	HR (95% IC) p																																																							
resténose de la carotide ≥ 70 %	5	2,3 (1,2–5,0)	10	4,2 (2,4–7,4)	0,52 (0,18–1,51) P = NS	7*	5,0 (2,5–11,2)	12**	8,3 (4,4–16,0)	0,58 (0,23–1,48) p = NS																																																							
Effets indésirables	NR																																																																

Référence	Bonati LH, Dobson J, Featherstone RL, Ederle Jvan der Worp HB et al, Long-term outcomes after stenting versus endarterectomy for treatment of symptomatic carotid stenosis: the international carotid stenting study (ICSS) randomized trial , Lancet 2015, 385 (9967):529-38
Type de l'étude	Étude contrôlée, randomisée, en ouvert, internationale
Date et durée de l'étude	Inclusion des patients entre mai 2001 et octobre 2008. Suivi jusqu'en 2011.
Objectif de l'étude	Évaluation à long terme de l'efficacité et de la tolérance des endoprothèses carotidiennes <i>versus</i> endarterectomie pour le traitement des sténoses carotidiennes symptomatiques.
METHODE	
Critères d'inclusion	Patients âgés de plus de 40 ans ayant une sténose athéroscléreuse symptomatique de la carotide $\geq 50\%$ (méthode NASCET) et jugés éligibles de manière équivalente aux 2 traitements (stenting ou endartériectomie). Les symptômes devaient survenir dans les 12 mois précédents la randomisation Critères de non inclusion : - Antécédents d'AVC majeur - ou antécédent d'endarterectomie ou d'angioplastie avec pose d'endoprothèse - contre-indication à l'endarterectomie ou à la pose d'une endoprothèse carotidienne - ou pathologie carotidienne non artérosclérotique - ou espérance de vie < 2 ans - ou une intervention importante dans les 30 jours suivants l'intervention de l'essai clinique
Cadre et lieu de l'étude	50 centres en Europe, États-Unis, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande
Produits étudiés	Au choix de l'implanteur, parmi des endoprothèses carotidiennes marquées CE et approuvées par le comité
Critère de jugement principal	Survenue d'AVC fatal ou invalidant
Critère(s) de jugement secondaire(s)	Décès toutes causes, AVC, AVC et décès lié à la procédure et AVC ipsilatéral survenant durant la période de suivi
Taille de l'échantillon	Le taux d'AVC était estimé à 5,7 % à 5 ans pour les 2 groupes de traitement : 1 500 patients nécessaires pour évaluer la différence en risque absolu sur les deux populations (IC 95%, ± 2.5 %)
Méthode de randomisation	Randomisation de l'essai ICSS : • Ratio 1 :1 • Randomisation centralisée avec un code généré par ordinateur. • Randomisation stratifiée selon le centre avec minimisation pour le sexe, âge, latéralité de la sténose et l'occlusion de la carotide controlatérale • Patients et investigateurs n'étaient pas en aveugle du traitement alloué Évaluation en aveugle des événements cliniques et des résultats angiographiques
Méthode d'analyse des résultats	Kaplan-Meier pour le risque cumulé à 1 an et à 5 ans Log-rank test : comparaison des courbes d'incidents cumulés Kaplan-Meier Les modèles de Cox ont été utilisés pour calculer les hazard ratios et les intervalles de confiance (95 %)

Nombre de sujets analysés	1 713 patients randomisés : 855 dans le bras des endoprothèses carotidiennes et 858 dans le bras endartériectomie 1 710 patients analysés (3 sorties d'étude)			
Durée du suivi	Suivi médian de 4.2 ans (IQR= 3.0-5.2 – maximum 10,0 ans)			
Caractéristiques des patients et comparabilité des groupes	Caractéristiques des patients à l'inclusion similaires dans les deux groupes.			
		Endoprothèse carotidienne	Endartériectomie	
	N=	853	857	
	Age moyen (DS)	70 (9)	70 (9)	
	Hommes n (%)	601 (70%)	606 (71%)	
	Degré de sténose carotidienne symptomatique n (%)	50-69%	92 (11%)	
		70-99%	761 (89%)	
	Évènement ipsilatéral récent n (%)	AVC ischémique hémisphérique	393 (46%)	
		Accident ischémique transitoire	273 (32%)	
		Infarctus rétinien	26(3%)	
		Amaurose fugace	148 (17%)	
		Non connu	13 (2%)	
		Survenue<6 mois	826 (97%)	
		Survenue<6 mois	27 (3%)	
		Score de Rankin modifié lors de la randomisation n (%)	0-2	756 (89%)
			3-5	81 (10%)
			Non connu	16 (2%)
	DS : déviation standard			
		Endoprothèse carotidienne		
	N=	828		
	Système de protection cérébrale n (%)	Oui	585 (71%)	
		Non	239 (29%)	
		Non connu	4 (0.5%)	
	Type de stent utilisé n (%)	Cellules fermées	371 (45 %)	
		Cellules ouvertes	367 (44 %)	
		Stent non déployé	64 (8 %)*	
Déploiement ou type de stent non connu		26 (3%)		
Traitement antiplaquettaire periprocedural n (%)	Tout double traitement antiplaquettaire	674 (81 %)		
	Aspirine + clopidogrel	594		
	Aspirine + dipyridamole+ clopidogrel	58		
	Aspirine + dipyridamole	12		
	Aspirine + ticlopidine	6		
	Dipyridamole+ clopidogrel	4		
	Simple anti agrégation plaquettaire	71 (9 %)		
	Aspirine seule	29		

Certaines parties du document ne sont pas lisibles car le demandeur a souhaité que certaines données commerciales et industrielles demeurent confidentielles

	<table><tr><td>Clopidogrel seul</td><td>42</td></tr><tr><td>Absence de traitement antiplaquettaire</td><td>16 (2 %)</td></tr><tr><td>Données manquantes</td><td>67 (8 %)</td></tr></table> *Les raisons ayant conduites à la non mise en place de l'end prothèse étaient les suivantes : difficultés d'accès à la sténoses (n = 38), occlusion d'une artère (n = 15), AVC fatal (n =1), IDM fatal avant le traitement (n = 1), autres complications médicales (n = 2), sténose < 50 % (n = 7)	Clopidogrel seul	42	Absence de traitement antiplaquettaire	16 (2 %)	Données manquantes	67 (8 %)																																					
Clopidogrel seul	42																																											
Absence de traitement antiplaquettaire	16 (2 %)																																											
Données manquantes	67 (8 %)																																											
Résultats inhérents au critère de jugement principal	le risque cumulé à 5 ans de survenue de cet évènement ne différait pas de manière significative entre les deux groupes (analyse en ITT). <table><tr><th>Population en ITT</th><th colspan="3">Endoprothèse (n=853)</th><th colspan="3">Endarterectomie</th><th rowspan="2">HR (CI 95%)</th><th rowspan="2">Différence à 1 an</th></tr><tr><th></th><th>Nombre d'évènements</th><th>Risque cumulé à 1 an</th><th>Risque cumulé à 5 ans</th><th>Nombre d'évènements</th><th>Risque cumulé à 1 an</th><th>Risque cumulé à 5 ans</th></tr><tr><td>AVC fatal ou invalidant</td><td>52</td><td>3,9 % (0,7)</td><td>6,4 % (0,9)</td><td>49</td><td>3,2 % (0,6)</td><td>6,5 % (1,0)</td><td>1,06 [0,72 ; 1,57]</td><td>0,7 [0,5 ; 1,0]</td></tr></table>	Population en ITT	Endoprothèse (n=853)			Endarterectomie			HR (CI 95%)	Différence à 1 an		Nombre d'évènements	Risque cumulé à 1 an	Risque cumulé à 5 ans	Nombre d'évènements	Risque cumulé à 1 an	Risque cumulé à 5 ans	AVC fatal ou invalidant	52	3,9 % (0,7)	6,4 % (0,9)	49	3,2 % (0,6)	6,5 % (1,0)	1,06 [0,72 ; 1,57]	0,7 [0,5 ; 1,0]																		
Population en ITT	Endoprothèse (n=853)			Endarterectomie			HR (CI 95%)	Différence à 1 an																																				
	Nombre d'évènements	Risque cumulé à 1 an	Risque cumulé à 5 ans	Nombre d'évènements	Risque cumulé à 1 an	Risque cumulé à 5 ans																																						
AVC fatal ou invalidant	52	3,9 % (0,7)	6,4 % (0,9)	49	3,2 % (0,6)	6,5 % (1,0)	1,06 [0,72 ; 1,57]	0,7 [0,5 ; 1,0]																																				
Résultats inhérents au(x) critère(s) de jugement secondaire(s)	Les AVC de tout type étaient significativement plus fréquents dans le groupe endoprothèse par rapport au groupe chirurgie (p < 0,001) mais étaient en majorité des AVC non invalidants Aucune différence significative entre les deux groupes pour les décès toute cause n'a été mise en évidence <table><tr><th>Popula tion en ITT</th><th colspan="3">Endoprothèse (n=853)</th><th colspan="3">Endartériectomie</th><th rowspan="2">HR (CI 95%)*</th><th rowspan="2">Différence risques absolus 95%) À 1 an</th></tr><tr><th></th><th>Nombre d'évènements*</th><th>Risque cumulé à 1 an</th><th>Risque cumulé à 5 ans *</th><th>Nombre d'évènement*s</th><th>Risque cumulé à 1 an</th><th>Risqu e cumulé à 5 ans</th></tr><tr><td>Tout AVC</td><td>119</td><td>9,5% (1,0)</td><td>15,2% (1,4)</td><td>72</td><td>5,1% (0,8)</td><td>9,4% (1,1)</td><td>1,71 [1,28 ; 2,3]◇</td><td>4,4% [1,9 ; 6,9]#</td></tr><tr><td>AVC per procéd ural ou décès per procéd ural</td><td>95</td><td>9,0% (1,0)</td><td>11,8% (1,2)</td><td>57</td><td>4,7% (0,7)</td><td>7,2% (0,9)</td><td>1,72 [1,24 ; 2,39] #</td><td>4,2% [1,9 ; 6,6]</td></tr><tr><td>Décès toutes causes</td><td>153</td><td>4,9% (0,7)</td><td>17,4% (1,5)</td><td>129</td><td>2,3% (0,5)</td><td>17,2 % (1,5)</td><td>1,17 [0,92 ; 1,48]</td><td>2,6% [0,8 ; 4,4]</td></tr></table> *Calculé comme le premier évènement survenu entre la randomisation et la fin du suivi. *Calculé à partir de la randomisation ◇ p< 0,001 #p< 0,01 La distribution des scores de l'échelle de Rankin modifiée à 1 an, 5 ans et en fin de suivi ne diffèrent pas de manière significative entre les deux groupes. La distribution du score de Rankin à la fin du suivi est décrite dans la figure ci-dessous :	Popula tion en ITT	Endoprothèse (n=853)			Endartériectomie			HR (CI 95%)*	Différence risques absolus 95%) À 1 an		Nombre d'évènements*	Risque cumulé à 1 an	Risque cumulé à 5 ans *	Nombre d'évènement*s	Risque cumulé à 1 an	Risqu e cumulé à 5 ans	Tout AVC	119	9,5% (1,0)	15,2% (1,4)	72	5,1% (0,8)	9,4% (1,1)	1,71 [1,28 ; 2,3]◇	4,4% [1,9 ; 6,9]#	AVC per procéd ural ou décès per procéd ural	95	9,0% (1,0)	11,8% (1,2)	57	4,7% (0,7)	7,2% (0,9)	1,72 [1,24 ; 2,39] #	4,2% [1,9 ; 6,6]	Décès toutes causes	153	4,9% (0,7)	17,4% (1,5)	129	2,3% (0,5)	17,2 % (1,5)	1,17 [0,92 ; 1,48]	2,6% [0,8 ; 4,4]
Popula tion en ITT	Endoprothèse (n=853)			Endartériectomie			HR (CI 95%)*	Différence risques absolus 95%) À 1 an																																				
	Nombre d'évènements*	Risque cumulé à 1 an	Risque cumulé à 5 ans *	Nombre d'évènement*s	Risque cumulé à 1 an	Risqu e cumulé à 5 ans																																						
Tout AVC	119	9,5% (1,0)	15,2% (1,4)	72	5,1% (0,8)	9,4% (1,1)	1,71 [1,28 ; 2,3]◇	4,4% [1,9 ; 6,9]#																																				
AVC per procéd ural ou décès per procéd ural	95	9,0% (1,0)	11,8% (1,2)	57	4,7% (0,7)	7,2% (0,9)	1,72 [1,24 ; 2,39] #	4,2% [1,9 ; 6,6]																																				
Décès toutes causes	153	4,9% (0,7)	17,4% (1,5)	129	2,3% (0,5)	17,2 % (1,5)	1,17 [0,92 ; 1,48]	2,6% [0,8 ; 4,4]																																				

	Modified Rankin score 0 1 2 3 4 5 6 CAS n=850 CEA n=853 Proportion of patients (%) [7 patients non inclus dans l'analyse (3 CAS, 4 CEA) car les scores n'ont pas été enregistrés au cours du suivi, patients en vie lors de la visite finale).
Effets indésirables	NR